

Живая вакцина для
первого прививания
щенков в возрасте
6 недель



Биокан DHPPi

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Живая вакцина против собачьей чумы (CDV), инфекционного ларинготрахеита (CAV-2), инфекционного гепатита (CAV-1), парвовируса (CPV-2), парагриппа (CPIV-2) у собак.

СОСТАВ

1 мл вакцины содержит:
Лиофилизированный компонент:
Вирус чумы собак (*Virus febris contagiosae canis*)
мин. $10^{3.0}$ ЦПД₅₀*, макс. $10^{4.5}$ ЦПД₅₀*
Вирус инфекционного ларинготрахеита собак (*Virus laryngotracheitidis contagiosae canis*)
мин. $10^{3.3}$ ЦПД₅₀*, макс. $10^{4.5}$ ЦПД₅₀*
Вирус парвовирусного энтерита собак (*Parvovirus enteritidis canis*)
мин. $10^{4.5}$ ЦПД₅₀*, макс. $10^{5.5}$ ЦПД₅₀*
Вирус парагриппа собак (*Virus parainfluenzae canis*)
мин. $10^{3.0}$ ЦПД₅₀*, макс. $10^{4.2}$ ЦПД₅₀*
*ЦПД – цитопатическая доза.

ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Собаки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вакцина предназначена для активной иммунизации собак против собачьей чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовируса и парагриппа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вакцину Биокан DHPPi можно применять отдельно или одновременно с другими вакцинами Биокан в соответствии с рекомендуемой схемой вакцинации или в группе с жидкими вакцинами Биокан (LR, L, C, R).

ДОЗИРОВКА

Доза – 1 мл независимо от возраста, веса и породы животного. Первичную вакцинацию можно проводить в возрасте 6 недель. Путь введения вакцины – подкожно, предпочтительно в область за лопаткой.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. Немедленно использовать после разведения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °C – 8 °C.

УПАКОВКА

5 × 1 мл вакцины Биокан DHPPi +
5 × 1 мл разбавителя
10 × 1 мл вакцины Биокан DHPPi +
10 × 1 мл разбавителя
50 × 1 мл вакцины Биокан DHPPi +
50 × 1 мл разбавителя