

АСД АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР ДОРОГОВА ФРАКЦИЯ 2



Применение:

Для лечения и профилактики болезней различной этиологии, повышения общей резистентности

Форма выпуска:

Стеклоанный флакон 20 мл, стеклоанный флакон 100 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка. Флакон 1 л.

Преимущества:

- Уникальный состав обеспечивает высокую эффективность.
- Надежная безопасность готовой лекарственной формы.
- Универсальная терапевтическая и профилактическая активность.
- Простота и удобство в применении.

Информируем Вас, что изменена фасовка лекарственного препарата АСД-2Ф по 20 мл с пластикового флакона на флакон из темного стекла с целью улучшения фармацевтических свойств.

Состав и фармакологические свойства.

Содержит в своем составе карбоновые кислоты, алифатические углеводороды, амины и амиды, алкилбензолы и замещенные фенолы, соединения с активной сульфидрильной группой и др., а также воду.

При пероральном применении оказывает активизирующее действие на центральную и вегетативную нервную системы, стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, секрецию пищеварительных желез, повышает активность пищеварительных и тканевых ферментов, улучшает проникновение ионов Na⁺ и K⁺ через клеточные мембраны, способствует нормализации процессов пищеварения, усвоения питательных веществ и повышению естественной резистентности организма.

При наружном применении препарат стимулирует активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализует трофику, и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.

Показания к применению.

«Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2» («АСД-2Ф») назначают сельскохозяйственным животным, птице и плотоядным животным для профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, при поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ, для стимуляции деятельности центральной и вегетативной нервной системы, повышения естественной резистентности у ослабленных и переболевших инфекционными и инвазионными болезнями, а также для стимуляции роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Дозы и порядок применения.

Внутри "АСД-2Ф" назначают животным с питьевой водой перед кормлением.

Наружно "АСД-2Ф" применяют в виде 15–20% растворов, приготовленных на стерильном физиологическом растворе или кипяченой воде. При приготовлении лечебного раствора требуемой концентрации исходный стерильный раствор "АСД-2Ф" принимают за 100%.

Коровам. При вагинитах и задержании последа (после его удаления) применяют 3-5% раствор "АСД-2Ф", подогретый до 40°С, которым промывают влагалище один раз в сутки в течение 4-5 дней, расходуя по 1,5-2 л раствора на каждую обработку. Если шейка матки открыта, то 200-300 мл раствора вводят в матку, и сразу же его удаляют.

При острых и хронических эндометритах, миометрите и пиометрите у коров, если шейка матки открыта, в полость матки вводят 15% раствор "АСД-2Ф", подогретый до 40°С, в объеме 200-300 мл и сразу же его удаляют. Для этих целей используют катетер с обратным током жидкости. Обработку проводят один раз в сутки в течение 4–5 дней. При трихомонозе коровам наряду с этиотропным лечением вводят во влагалище 20% раствор "АСД-2Ф" при помощи шприца Жанэ с резиновой трубкой и специального катетера, имеющего на конечной части большое количество отверстий. Лечение проводят один раз в сутки в течение 5-7 дней, расходуя по 200-300 мл раствора на каждую процедуру.

При лечении быков, больных острой формой трихомоноза, наряду с этиотропным лечением, препуциальный мешок промывают 2-3% раствором "АСД-2Ф", который вводят с помощью катетера, соединенного резиновой трубкой с кружкой Эсмарха в количестве 0,5-1,0 л. После этого наружное отверстие препуциального мешка зажимают на 3-5 минут рукой и производят легкий массаж. Лечение проводят один раз в сутки в течение 5-7 дней.

При тимпании крупного рогатого скота препарат "АСД-2Ф" выпаивают животному или вводят в рубец через желудочный зонд один-два раза в сутки в разовой дозе, указанной в таблице 1, но не более 3 дней. В процессе лечения назначают теплые клизмы, массаж рубца и другие процедуры, предусмотренные при указанной патологии.

В целях повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, увеличения привесов и снижения смертности, "АСД-2Ф" телятам – выпаивают с молоком или водой для поения из расчета 0,1 мл "АСД-2Ф" на 1 кг массы животного через день в течение 1–2 месяцев. Поросятам назначают препарат индивидуально в смеси с комбикормом из расчета 0,1 мл "АСД-2Ф" на 1 кг массы животного с 7-дневного до 2-месячного возраста.

При катаральной пневмонии, диспепсии, гастроэнтероколитах, гастроэнтеритах наряду с этиотропным лечением "АСД-2Ф" назначают пороссятам один раз в день с питьевой водой за 30-40 минут до кормления, в дозах, указанных в таблице 1. Лечение проводят курсами по 5 дней с интервалом 2-3 дня до выздоровления.

Лошадям при метеоризме кишечника "АСД-2Ф" выпаивают или вводят через желудочный зонд однократно в дозах, указанных в таблице 1.

В процессе лечения назначают теплые клизмы, массаж живота и другие процедуры, предусмотренные при указанной патологии. При необходимости лечение повторяют. При мытье лошадей и наличии абсцессов в подчелюстном пространстве и на других частях тела после предварительного туалета полости абсцессов промывают 15-20% раствором "АСД-2Ф" или вводят в них пропитанные раствором тампоны один раз в день в течение 7–9 дней до очищения раны от гноя и появления грануляции. При диспепсии, гастроэнтероколитах, гастроэнтеритах, а также дистрофических состояниях, вызванных расстройством пищеварения и нарушениями обмена веществ "АСД-2Ф", назначают животным внутрь один раз в сутки, в разовых дозах, указанных в таблице 1. Лечение проводят курсами по 5 дней с интервалом 2-3 дня до выздоровления животного. В целях стимуляции центральной и вегетативной нервной системы, повышения резистентности у переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, ускорения процессов заживления кожных покровов, при некробактериозе, экземах, дерматитах, трофических язвах "АСД-2Ф" применяют с питьевой водой один раз в сутки в дозах, указанных в таблице 1. Лечение проводят курсами по 5 дней с интервалом 3 дня до выздоровления.

Таблица 1. Дозы препарата "АСД-2Ф".

Вид животных, возраст		Объем	
		Препарата "АСД-2Ф", мл	Воды, мл
Крупный рогатый скот	от 3 лет и старше от 1 года до 3 лет	20-30	200-400
	до 1 года	10-15	100-400
		5-7	40-100
Овцы	от года и старше	2-5	40-100
	от 1/2 года и до 1 года	1-3	20-80
	до 1/2 года	0,5-2	10-40
Лошади	от 3 лет и старше	10-20	200-600
	от 1 года до 3 лет	10-15	200-400
	до 1 года	5	100
Свиньи	от года и старше	5-10	100-200
	от 1/2 года и до 1 года	2-5	40-100
	2-3 месяца	1-3	20-80
Собаки	старше 6 мес.	2	40

Инфицированные вялозаживающие раны промывают 15-20% раствором "АСД-2Ф" и, после этого накладывают смоченную этим раствором повязку. Лечение проводят 1–2 раза в сутки в течение 4–5 дней до очищения раны от гноя. При наличии свищей, вскрытых полостей абсцессов, дренаж в их полость вводят марлевый дренаж, смоченный раствором препарата, а свернутой повязкой накладывают стерильную повязку. Дренаж меняют ежедневно до образования грануляционного вала.

Птице препарат применяют для повышения резистентности организма, успешного формирования иммунитета, стимуляции роста и развития, а также при аптериозе, для лечения и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, респираторных болезнях. Для повышения яйценоскости и профилактики овариосальпингитов. Схемы и дозы применения препарата указаны в таблице 2.

Таблица 2. Применение препарата "АСД-2Ф" в птицеводстве.

Показания к применению	Доза "АСД-2Ф"	Схема применения
Суточным цыплятам для повышения резистентности; развития и формирования иммунитета	35 мл на 100 л питьевой воды	7 дней подряд, затем 2 дня до и 2 дня после вакцинации.
Цыплятам, индюшатам, утятам, гусятам для стимуляции роста; при аптериозе	5 мл 10% водного раствора на 1 м ³ птичника	Аэрозольно в 1-, 10-, 28- и 38-дневном возрасте; экспозиция – 15 мин.
Для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта и повышения резистентности	3 мл на 100 голов птиц (15 мл "АСД-2Ф" / 100 л воды)	С водой для поения в течение 7 дней подряд

При респираторных болезнях, в т.ч. инфекционном ларинготрахеите; инфекционном бронхите кур; респираторном микоплазмозе и колисептициемии	молодняку птиц – 10 мл на 1000 голов (5,0 мл "АСД-2Ф"/100 л воды); взрослому поголовью – 30 мл на 1000 голов (15 мл "АСД-2Ф"/100 л воды)	С водой в течение 5 дней подряд
Курам-несушкам для профилактики овариосальпингитов и повышения яйценоскости	35 мл на 100 л питьевой воды	С водой в течение 5–7 дней подряд
Цыплятам для стимуляции роста и развития	0,1 мл на 1 кг массы птицы	С водой через день в течение 1–2 месяцев

Побочные явления.

Побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

Особые указания.

Препарат не исключает использование других лекарственных средств специфической или симптоматической терапии.

Молоко дойных животных и яйцо птицы после применения препарата используется без ограничений. В случае вынужденного убоя животных мясо используется без ограничений.

Хранение.

Хранить в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от света месте, при температуре от 4°С до 35°С. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Форма выпуска.

"АСД-2Ф" – стеклоанный флакон 20 мл, стеклоанный флакон 100 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка. Флакон 1 л.