

# Ацепромал

раствор для инъекций



## Состав

1 мл препарата содержит:  
ацепромазина малаеат — 10 мг

## Описание

Жидкость желтоватого цвета, прозрачная.

## Фармакологические свойства

Ацепромазина малаеат — нейролептик группы фенотиазин, препаратов седативного действия. Применение его в виде раствора для инъекций 1% дает успокаивающий и миорелаксирующий эффект, благодаря снижению возбуждения центральной нервной системы. В то же время препарат обладает гипотермическим, гипотензивным, антигистаминным, адренолитическим, спазмолитическим, противорвотным действием, усиливает снотворные и средства для местной анестезии. При внутривенном введении действие препарата проявляется через 5–8 минут, а при внутримышечном — через 15–25 минут. Успокаивающий эффект длится около часа. При парентеральном введении ацепромазина малаеат быстро проникает во все ткани.

Метаболизм ацепромазина малаеата происходит в печени, а выведение — через почки.

## Показания

Препарат применяют животным для премедикации перед хирургическим вмешательством за 15–20 минут до введения основного анестетика, для ослабления боли, успокоения агрессивных животных перед осмотром и транспортировкой, как спазмолитик (для лошадей).

## Противопоказания

Не назначать животным с нарушениями функции печени, сердца, легких, сахарным диабетом и самкам во время беременности. Не применять при гипотермии, гипотензии, кровотечениях со значительной потерей крови и при интоксикации стрихнином.

Не использовать вместе с органофосфатами (инсектицидами), местными анестетиками.



## Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно, вводят медленно внутривенно (в/в) или глубоко внутримышечно (в/м), жеребцам и котам только внутримышечно. Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных	Способ введения	Доза, мл / 10 кг массы тела	
		допустимая	оптимальная
Крупный рогатый скот	в/в	0,05–0,1	0,1
	в/м	0,1–0,15	0,15
Овцы, козы	в/в	0,1–1	0,5
	в/м	0,2–1,5	1
Лошади	в/в	0,05–0,1	0,1
	в/м	0,1–0,15	0,15
Свиньи	в/в	0,05–0,1	0,1
	в/м	0,1–0,15	0,15
Собаки	в/в	0,3–0,5	0,5
	в/м	0,5–1	1
Коты	в/м	0,5	0,5

## Предостережения

Внутривенное введение осуществлять медленно!

Увеличение дозы не приводит к пролонгации действия препарата.

Избегать контакта препарата с кожей.

Препарат не дает анальгетического эффекта, поэтому для обезболивания следует использовать анальгетик.

Жеребцам препарат вводить только внутримышечно, придерживаясь минимальной дозы.

К препарату чувствительны собаки крупных пород, грейхаунды, боксеры и другие брахицефальные породы.

У некоторых животных возможно возникновение брадикардии, сужение дыхательных путей, незначительное снижение температуры тела, при быстром введении возможна сердечная аритмия.

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 5 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 1 сутки. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

## Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10, 50, 100 мл.

## Срок годности

2 года.

## Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °С.

После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 30 дней.