

25.04.2018

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Адвантік®

### 2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаクロпід – 10,0 г;

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідроксиглупол, N-метилпіролідон, мігелол 812, лимонна кислота.

### 3. Фармацевтична форма

Краплі для зовнішнього застосування.

### 4. Фармакологічні властивості:

ATC vet: QP53, ектохаризитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбітації)

Адвантік® – є ектохаризитицидом, до складу якого входять діючі речовини імідаクロпід, який має хлорнікотінілову структуру та перметрин – синтетичний піретройд. Ця комбінація речовин діє як інсектицид, акаріцид та забезпечує репелентну активність препарату. Задяки такому типу дії препарат знижує різик захворювання трансмісією захворюваннями собак (CVBD), таких як бореїоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейкініоз.

Діюча речовина препарату *Імідаクロпід*, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenemalimide – ектохаризитицид, що належить до групи хлорнікотінілових сполук. Має високу спірідіність до никотінергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптических ділянках центральної первинної системи бліх. Він приєднується до никотінергічного рецептора блоки, розміщеного на постсинаптичному віброзі, передаває передачу першого імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаクロпіду з никотіновими рецепторами ссавців обумовлює низьку рівень проникнення через гемітоцефалічний бар’єр, тому імідаクロпід практично не впливає на ПВС тварин. Імідаクロпід ефективний проти личинок бліх та зірник осіб.

Після місцевого застосування препарату, імідаクロпід швидко розподіляється по всій шкірі тварини широмів одного для після занесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

*Перметрин* – циклопропанкарбонкова кислота, 3-(2,2-дихоретил) 2,2-диметил-(3-феноксифеніл) метиленстер – належить до першого класу піретройдів. Піретройди викликають порушення електропровідності натрієвих каналів у хребетних та безхребетних. Піретройди порушують здатність натрієвих каналів до активності та інактивації. Це лікуюче становітій передбудження та трепор, судоми дорсальних м'язів та загибель паразита.

Адвантік® препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварин. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та всередині тварин триває протягом 4-х тижнів.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Собаки.

#### 5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus* *appendicatus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Trichodectes canis*), волохом. Відлікування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів.

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

**5.3 Протипоказання**

Не застосовувати цукнітам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчувствливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

**5.4 Побочна дія**

У рідких випадках застосування препарату може викликати подразнення шкіри (свербіж, півперевороніння), пригнічення, які самовільно проходять.

**5.5 Особливі застереження при використанні**

Немас.

**5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості**

Застережень немає.

**5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії**

Невідомо.

**5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку**

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклоприд та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

<i>Собаки масою тіла, кг</i>	<i>Торгова назва</i>	<i>Об'єм, мл</i>	<i>Імідаклоприд (мг/кг маси)</i>	<i>Перметрин (мг/кг маси)</i>
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів. Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місце перебування тварин. Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик йонізації трансмісійних хвороб.

Препарат залишається ефективний при замоканні персті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

**Способ застосування:**

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть конічок, нереверніть його та одягніть на піпетку, таким чином виділивши фольгу.

25.04.2019



При обробці тварини повинні стояти.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець пінетки на шкіру, міцно стисніть пінетку декілька разів, і нанесіть весь сміс безсередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносить у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуєчи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кіничок пінетки на шкіру та обережно стисніть пінетку і рівномірно нанесіть сміс пінетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злимання твариною нанесеного засобу.

#### **Способ застосування:**

Вийміть пінетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на пінетку, таким чином виділничи фольгу.



При обробці тварини повинні бути у стоячому положенні.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець пінетки на шкіру, міцно стисніть пінетку декілька разів, і нанесіть весь сміс безсередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносить у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуєчи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кіничок пінетки на шкіру та обережно стисніть пінетку і рівномірно нанесіть сміс пінетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злимання твариною нанесеного засобу.

#### **5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)**

Передозування препарату у 5 разів від рекомендованої дози не викликало пінких симптомів передозування у цуценят та дорослих собак.

Отруєння препаратом Адвантікс® відбувається випадкового перорального попадання маломовніро, у таких випадках проводиться симптоматичне лікування тварин під контролем лікаря ветеринарної медицини. Специфічного антидоту немає. При випадковому пероральному попаданні препарату можливі ускладнення нервового характеру (тремор, пригнічення).

#### **5.10 Спеціальні застереження**

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі та всередину (травний канал).

#### **5.11 Период виведення (каренції)**

Для непродуктивних тварин не регламентується.

**Адвантік®**  
**(краплі для зовнішнього застосування)**  
**листівка-вкладка**

**Опис**

Прозорий розчин від жовтого до коричневого кольору.

**Склад**

100 мг препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метиціроліден, міглюз 812, лимонна кислота.

**Фармакологічні властивості**

ATC код: QP53, ектопараразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)

Адвантік® – це ектопараразитицид, до складу якого входять діючі речовини: імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин – синтетичний піретройд. Ця комбінація речовин діє як інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяко такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісійними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерахіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-Chloro-3- pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопараразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотінергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотінергічного рецептора бліхи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому приводить до загибелі паразита. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами есантів обумовлює низький рівень проникнення через гематоцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та тріщин особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджується по всій шкірі тварин впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

*Перметрин* – циклоопранкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлорети) 2,2-диметил-, (3-феноксифеніл) метилестер – належить до першого класу піретройдів. Піретройди викликають порушення електропровідності інтрієвих каналів у хребетних та безхребетних. Піретройди порушують здатність натрієвих каналів до активізації та інактивації. Це викликає стани перевбудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загибелі паразита.

Адвантік® – препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварин. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), воннами (*Trichodectes canis*), волосоїдами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів.

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

**Дозування**

Мінімальна рекомендована доза препарату – 10 мг імідаклоприду та 50 мг перметріну на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні пілєтки препарату.

<i>Собаки масою тіла, кг</i>	<i>Торгова назва</i>	<i>Об'єм, мл</i>	<i>Індаклоприд (мг/кг м.н.)</i>	<i>Перметрин (мг/кг м.т.)</i>
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів. Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місце перебування тварин. Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик виникнення трансмісійних хвороб.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності біліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

#### *Способ застосування:*

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть кіпчаток, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видавивши фольгу.



При обробці тварини повинні стояти.

#### *Собаки до 10 кг:*

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть нульовий кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

#### *Собаки більше 10 кг:*

Препарат наносить у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному напесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру.

Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При напесенні препарату на

25.04.2019

шкіру уникніть попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

**Протипоказання**

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчувствливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

**Застереження**

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Обробку тварин рекомендуються проводити у захисних рукавицях. Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з мильом. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточою водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Розчинник, що входить до складу Адвантікс®, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, текстиль, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин пімагайтесь не допускати контакту тварин з подібними матеріалами до повного висихання персті.

**Форма випуску**

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0,4 мл (Адвантікс® для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4–10 кг), 2,5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10–25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 25–40 кг), 6,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 40–60 кг) зашкодовані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

**Зберігання**

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому приміщенні при температурі від 0 до 25° С.

Зберігати окрім від продуктів харчування та кормів.

**Термін придатності**

5 років.

3 роки – для Адвантікс® для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг.

**Для застосування у ветеринарійській медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення**

Байєр Еніміл Хелс ГмбХ  
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany) D-51368,  
Leverkusen

**Виробник готового продукту**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
Просндорферстр. 324, D-24106 Кіль,  
Німеччина

KVP Pharma+VeterinarProdukte GmbH  
(Germany) ProjensdorfeStr. 324, D-24106 Kiel









Дод

до реєстраційного посвідчення АА-050984



Advantix®




Advantix®

Адвантікс® для собак масою тіла  
від 40 до 60 кг

Для профілактики і лікування ураження  
собак кліщами (блохами, відлякуючими  
комарями, москітів) і мух від собак.

Адвантікс® для собак масою тіла  
від 40 до 60 кг

Для профілактики і лікування пораження  
собак кліщами і блокування отрутування  
комарів, москітів і мух від собак.



4 х 6,0 мл



40-60 кг

Advantix®

Advantix®

Адвантікс®  
для собак масою тіла  
від 40 до 60 кг

Інструкція  
на дії та застосування



Запрещено відривати.  
Розривання пакету може зробити його непотрібною  
для застосування. Використовуйте лише  
запечатані пакети. Використані пакети  
зберігайте вдали від досягнення дітей.

Спиртовий спирт або інші  
спиртові речовини можуть  
знищити ефективність продукту.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.

Використовуйте лише  
запечатані пакети в  
відсутності дітей та домашніх  
птахів.



Bayer