

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Байварол®

2. Склад

Одна смужка містить діючу речовину: флуметрип – 3,6 мг.

Допоміжні речовини: поліетилен низької щільності.

3. Фармацевтична форма

Цілий білий пластиковий смужок.

4. Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

ATCvet Code: QP33AC05

Флуметрип – синтетичний пірепрод другого типу акції, затримав, викликає довготривале прокидання нагір'ю у період намірання у період збудження. Група альфа-ціаню на фрагменті фенокси-фторобензенового шарту віднодіалтна та довготривалу прокиданість нагір'ю. Другий тип пірепродів протрує отруйни синдром акції характеризується корективним (малею тіла)

і синтетичною.

Фармакокінетика

Після застосування Байваролу® відбувається повільний абсорбція флуметрипу з поліетиленового нагір'ю. Флуметрип приєднується до білків, а потім розповсюджується всередині акції білково сім'ї.

Використання у акцій мінівідання.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Вівця.

5.2. Показання до застосування

Для діалності та контролю флуметрип цупиння *Favos dosynote* у медоносних білках.

5.3. Протипоказання

Не застосовувати після медодбору.

5.4. Побічна дія

Немає.

5.5. Особливі застереження при використанні

Застережень немає.

5.6. Використання під час вагітності, лакції, годування

Не відзначається.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідомо.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Смужки віддають у акцій у просторах між рамками в центральній зоні бджолиного гнізда так, щоб білочки могли перебігати по ним з обох сторін. Обидві петлі для підвішування відзначають утвору в одному напрямку до маркованих ділянок гнізда і віддають смужки на верхню рейку секційної рамки.

Для сильних бджолинь (і нормальних рокисток, які вивели та вивели відмають 9-10 стандартних рамок, а акцію 20 і більше, застосовують чотири смужки. Слабкі бджолинь, які вивели та вивели відмають 6 і менше рамок, а акцію менше 20, віддають та молочною білком отримують половину дози, тобто дві половини. Для великих сімей, які відмають декілька гніздових корпусів, застосовують чотири смужки на корпус, які розташовують в центрі міжрамкового простору.

Вивели замінують обробки за два тижні до початку медодбору. Під час медодбору категорично забороняють використання смужок, а акції літа - після відмачки товарного меду.

Наберання ефективності Байваролу® проявляє при застосуванні в акції літа після медодбору. Байваролу® можна застосовувати у будь-яку пору року для діалності, а також для лікування вартості у випадках інтенсивної шкідливості бджолинь.

Діяльність. Перед підбилюванням смужок двоє члени команди перевіряють частоту артульєвського паперу.
Через 24 години після підбилювання смужок двоє перевіряють на наявність загиблих кліщів паразитів.

Діювання. Тривалість застосування смужок - не більше шести тижнів.

8.9. Передозування (симптоми, медичальні заходи, антидот)

Немає.

8.10. Спеціальні застереження

Немає.

8.11. Період видалення (карентин)

0 днів.

8.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Не приймати їжу та не палити від час застосування препарату.

Вмити руки після роботи з препаратом.

Забезпечити нейтралізацію смужок у мисл призначеної для споживання.

9. Фармацевтичні особливості

9.1. Форми висушувальності

Немає.

9.2. Термін придатності

3 роки.

9.3. Особливі застереження щодо зберігання

Зберігати в місцях недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування та кормів.
Відкривати пакети з фольги безпосередньо перед застосуванням.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

9.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

У картонній коробці містяться 5 пакетів з фольги, в кожному пакеті - 4 пластмасові смужки.

9.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невипорощеним препаратом або її його залишками

Використані смужки загорнути у зупий папір та викинути разом з домашнім сміттям.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Гельмт Хаелт ГмбХ, D-51368
Леверкузен, Німеччина

Байер Анімал Хелтх ГмбХ, D-51368
Леверкузен, Germany

8. Назва та місцезнаходження виробника

КНП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Профессорбуер стр. 324, D-24106 Кіель,
Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,
Professorbuer Str. 324, D-24106 Kiel,
Germany

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Байварол® пастички-вкладки

Опис

Щільні білі пластинкові смужки.

Склад

Одна смужка містить діючу речовину: флуометрин – 3,6 мг.

Діючій речовині приспівують незначні кількості.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

ATCvet Code: QP53AC05

Флуометрин – синтетичний препарат другого ряду зній, зазвичай, викликає довготривале пролонговане вмірю у нервово м'язовому у період збудження. Група амфо-піро на фрагменті феносо-фторбензіміловому ступу відновлюється та довготривалу пролонгованість вмірю. Другий тип препаратів продукую отруйні синдром зній характеризується хорезитетом (жовтий піл)

і спазмолізю.

Фармакокінетика

Після застосування Байваролу® відбувається повільний вихід флуометрину з підшкірневоного м'язу. Флуометрин зберігається до білка, а потім розпадається на окремі часті будово 0,1М.

Використання у свиней мінімумею.

Застосування

Для лікування та контролю флуометрин чужиних *Rattus dentytor* у мезосонна бляді.

Дозування

Смужки вішють у вушках у просторах між ривками а центральній зоні бляжяного гніда так, щоб бляжон могли переміщатися по ним з обох сторін. Обидві часті для підлікування відзначають отору в одному напрямку по міркованню лінійк знову і вішють смужки на верхово рейку однієї ривки.

Для свиней бляжосімей із нормальним розвитком, які вагітні та розсила вішють 9-10 стандартних ривок, а вмірю 20 і більше, застосовують чотирі смужки. Слабій бляжосімей, які вагітні та розсила вішють 6 і менше ривок, а вмірю менше 20, відводять та молотій робочій бляжосі отримують пасовину дона, тобто дві півсосу. Для великих свиней, які вагітні та розсила і відновних корпусів, застосовують чотирі смужки на корпус, які розширюють в центрі міркованого простору.

Навесні замінують обробки за два тижні до початку мезодобору. Під час мезодобору категорично забороняє використання смужок, а кімні літа - після підняття товарного мезу.

Найефективніші Байварол® проявляє при застосуванні а кімні літа після мезодобору. Байварол® можна застосовувати у будь-яку отору року для лікування, а також для лікування отору оту у випадках інтенсивної інвазії бляжосімей.

Діагностика. Перед підлікуванням смужок дво вушка покривають чистим крупишем паперу. Через 24 години після підлікування смужок дво перевіряють на наявність заслібок кінців парок.

Лікування. Тривалість застосування смужок - не більше шести тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати вічас мезодобору.

Застереження

Дотримуватися вказівок по застосуванню.

Форма випуску

У картонній коробці містяться 5 пакетів з фольга, а кожного пакеті - 4 пластинкові смужки.

Зберігання

Зберігати в місцях недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування та кормів. Відкривати пакети з фольга безпосередньо перед застосуванням.

Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Термін придатності - 3 роки.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Фарма Хелс ГмбХ, D-51368
Лeverkusen, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH, D-51368
Leverkusen, Germany

Назва та місцезнаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Прюмслерфер стр. 324, D-24106 Кіел,
Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,
Prümsdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Germany

