

Брометронид новый таблетки

таблетки для перорального применения



Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
тинидазол – 250 мг

Описание

Таблетки светло-желтого цвета.

Фармакологические свойства

Тинидазол – синтетический препарат широкого спектра действия на простейших *Balantidium coli*, *Entamoeba histolytica*, *Treponema hyodysenteriae*, *Histomonas meleagridis*, *Lambia intestinalis*, *Eimeria* spp., *Trichomonas columbae*, *T. gallinae*, бактерицидного действия на анаэробов *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp., *Clostridium* spp., большинство видов грамположительных и грамотрицательных кокков и пр.

Тинидазол быстро и почти полностью абсорбируется из ЖКТ. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 часа и сохраняется в течение 12 часов. Хорошо распределяется во всех тканях организма, биотрансформируется в печени. Около 60% препарата выводится с мочой, 12% – с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу:

- **птица (голуби, декоративные фазаны)** – гистомоноз, трихомоноз, эймериоз, сальмонеллез;
- **собаки, коты** – лямблиоз, амебиоз, трихомоноз, другие анаэробные инфекции;
- **декоративные кролики** – эймериоз.

Противопоказания

Не назначать животным, чувствительным к тинидазолу, с нарушениями функций печени и почек, в последнюю треть беременности.



Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально.

Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных и заболевания	Доза, таблетка		Применение
	на 1 кг корма	на кг массы тела	
Птица (голуби, декоративные фазаны):			
лечение	2 (измельчить)		10 дней
Собаки:			
лямблиоз, амебиоз		1 на 20–25 кг	5 дней
анаэробные инфекции		1 на 18–20 кг	2–3 недели
Коты:			
лямблиоз, трихомоноз		1/4 на 5 кг	10 дней
Декоративные кролики:			
эймериоз (взрослые животные)		1/4 на 1 кг	3 дня
при отлучении от матери (молодняк)		1/4 на 2 кг	10 дней

Предостережения

У животных, чувствительных к тинидазолу, могут возникать аллергические реакции в виде лихорадки, крапивницы, рвоты. После отмены препарата эти симптомы исчезают без специального лечения.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 3 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +8 до +25 °С.

Срок годности

3 года.