

Бровадазол плюс

порошок для перорального применения



Состав

1 г препарата содержит:
пиперазина адипинат — 250 мг
фенбендазол — 30 мг

Описание

Порошок белого цвета, без запаха, нелетучий, негигроскопичный, нерастворимый в воде.

Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканальцы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они не способны к дальнейшему развитию.

Комбинация фенбендазола и пиперазина адипината усиливает действие препарата против возбудителей семейства Ascaridae.

Показания

Лечение и профилактика животных при нематодозах, вызванных:

- **свиньи** — половозрелыми нематодами и личинками 4 стадии *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, половозрелыми *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*, легочными гельминтами *Metastrongylus* spp.;
- **лошади** — нематодами ЖКТ *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylidae* gen.;
- **плотоядные животные (собаки, лисы, песцы)** — нематодами ЖКТ *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*;
- **кролики** — *Passalurus ambiguus*;
- **птица (куры, индейки, перепелки, фазаны)** — *Ascaridia galli*, *Capillaria anseris*, *Heterakis gallinarum*, *H. isolochae*, *Tetrameres* spp.;
- **водоплавающая птица (гуси, утки)** — *Amidostomum anseris*, *Syngamus trachea*, *Tetrameres fissispina*.

Противопоказания

Не назначать свиноматкам за две недели до опороса.



Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают во время утреннего кормления. Дозы препарата для разных видов животных приведены в таблице.

Вид животных и заболевания	Доза, г / 10 кг массы тела	Применение
Свиньи:		
аскароз, трихоцефалез, зеофагостомоз, метастронгилез, стронгилоидоз	1,5	2 дня
оллуланоз, физицефалез	3	2 дня
Поросята в возрасте 1–4 месяца:		
профилактика	0,4–0,5	1 раз в неделю
Лошади:		
параскароз, оксиуроз, стронгилятоз, стронгилоидоз	1,5–2	однократно
Жеребята в возрасте 1–6 месяцев:		
смешанная инвазия	1	2 дня
Плотоядные и пушные звери:		
анкилостомоз, стронгилоидоз, токсокароз, токсаскароз, унцинариоз	8–10	3 дня
Кролики:		
пасалуриоз, протостронгилез, трихостронгилез, трихоцефалез	5	однократно
Куры:		
аскаридиоз, гетеракидоз, капилляриоз	1,5	2 дня
сингамоз	2	2 дня
Водоплавающая птица:		
амидостомоз, тетрамероз, гангулетеракидоз	2–2,5	2 дня
гименолепидоз, нотоколидоз	7,5–8	2 дня

Предостережения

Препарат несовместим со щелочами и окислителями, а также с йод-содержащими средствами.

После последнего применения препарата забой животных и птицы на мясо разрешается через 7 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 100, 1000 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °С.

Срок годности

3 года.