

## Бровадазол таблетки

таблетки для перорального применения



### Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:  
фенбендазол — 50 мг

### Описание

Таблетки белого или сероватого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские.

### Фармакологические свойства

Фенбендазол относится к группе бензимидазолов. Разрушает микроканалы пищеварительных клеток и вызывает нейротоксический эффект у гельминтов. Губительно действует на личинки разных стадий и нарушает целостность оболочек яиц гельминтов, после чего они не способны к дальнейшему развитию.

### Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, плотоядных, пушных зверей, кур, гусей** при поражении зрелыми и незрелыми формами нематод, некоторыми видами цестод и трематод.

### Противопоказания

Не применять одновременно с противофасциоллезными препаратами, а также в течение 7 дней после лечения животных бромсалами.

### Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом и дают в начале утреннего кормления. Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных и заболевания	Доза, таб. / 10 кг массы тела	Применение
<b>Крупный рогатый скот:</b>		
диктиокаулез, стронгилятоз, стронгилоидоз	2	однократно
дикроцелиоз	6,6	однократно
цистицеркоз	5	3 дня
<b>Мелкий рогатый скот:</b>		
смешанная нематодозная инвазия	3	однократно
мониезиоз	2	однократно
трихуроз	3	2 дня
эхинококкоз, ценуроз	8	3 дня
дикроцелиоз	4,4	2 дня



Вид животных и заболевания	Доза, таб. / 10 кг массы тела	Применение
<b>Свины:</b>		
аскароз	1,5	2 дня
трихуроз	2	2 раза в сутки
зоофагостомоз, стронгилоидоз	2	однократно
<b>смешанная инвазия:</b>		
• поросята в возрасте 2–8 недель	0,2	1 раз в неделю
• маточное поголовье	1,5	2 раза в сутки
<b>Лошади:</b>		
параскаридоз, стронгилятоз	3	однократно
стронгилоидоз (жеребата в возрасте 1–2 месяца)	1,6	2 дня
<b>Плотоядные и пушные звери:</b>		
смешанная инвазия	3	однократно
<b>Куры:</b>		
аскаридиоз	1	2 дня
аскаридиоз, гетеракидоз	2	однократно
<b>Гуси:</b>		
смешанная инвазия	8	однократно

### Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота, овец, коз, свиней на мясо разрешается через 10 суток, птицы — через 3 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце животных можно через 20 суток, молоко — через 2 суток.

### Упаковка

Блистеры по 10 таблеток (по 1 и 3 шт. в картонной коробке).

### Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °С.

### Срок годности

3 года.