

## Броваферан-100

раствор для инъекций



### Состав

1 мл препарата содержит:  
**декстрановый комплекс трехвалентного железа — 100 мг**

### Описание

Жидкость красно-бурого цвета.

### Фармакологические свойства

Комплексное соединение гидроокиси железа и низкомолекулярного декстрана восполняет дефицит железа, стимулирует кроветворную систему, повышает уровень гемоглобина, способствует увеличению количества эритроцитов и улучшает сохранность молодняка домашних животных.

### Показания

Лечение и профилактика железодефицитной анемии у **животных**, особенно у **поросят и телят**.

### Противопоказания

Не применять животным с признаками острой нехватки витамина Е и селена.



### Способ применения и дозы

Перед применением препарат подогревают до температуры тела животного и вводят глубоко внутримышечно в область бедра или шеи. Профилактическая доза вводится однократно и составляет (на 1 животное):

- **свиноматки** за 3–4 недели до опороса — 10 мл;
- **поросята** в возрасте 3–4 суток — 1,5–2 мл;
- **телята** в возрасте 5–6 суток — 8–10 мл;
- **ягнята** в возрасте 3–5 суток — 2–3 мл;
- **норки** — 0,3–0,5 мл.

Для лечения животных с признаками анемии препарат вводят 2–3 раза каждую неделю в указанных дозах.

### Предостережения

В месте введения может возникнуть небольшой отек, который исчезает через несколько дней.

Антациды замедляют усвоение железа.

Применение с ацетогидроксамовой кислотой снижает эффективность обоих препаратов, при использовании с препаратами железа возможно накопление железа в печени.

Одновременное применение со средствами тетрациклиновой группы снижает эффективность последних, их можно вводить с интервалом 2–3 часа.

В сочетании с токоферолом снижается эффективность обоих препаратов, в комбинации с холестирамином — эффективность препаратов железа, в сочетании с этидроновой кислотой — эффективность последней, ее можно вводить через 2 часа.

### Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20, 100 мл.

### Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +3 до +25 °С. Не допускать замораживания препарата.

После вскрытия флакона препарат использовать в течение 24 часов.

### Срок годности

3 года.