

Бровальзен-250 таблетки

таблетки для перорального применения



Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
альбендазол — 250 мг

Описание

Таблетки светло-желтого или оранжевого цвета, круглой цилиндрической формы.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов. Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные реакции, что вызывает гибель паразитов.

Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак и кур** при поражении половозрелыми нематодами и личинками ЖКТ и легких *Anisakidae*, *Ancylostomatidae*, *Ascaridae*, *Dictyocaulidae*, *Oxyuridae*, *Protostrongylidae*, *Strongylidae*, *Syphacidae*, *Trichuridae*, *Trichonematidae*, *Trichostrongylidae* и пр., цестодами *Avitellinidae*, *Anoplocephalidae*, *Taeniidae*, половозрелыми трематодами *Fasciolidae*, *Dicrocoelidae*.

Противопоказания

Не назначать самкам в первый месяц после осеменения.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно до начала утреннего кормления. Крупному рогатому скоту, овцам препарат дают на корень языка или в смеси с концентрированным кормом. Птице дозу делят на 2 части и дают с интервалом в сутки.

Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.



Вид животных	Заболевания	Доза, 1 г / кг массы тела	Доза, г / 10 кг массы тела
Крупный рогатый скот	нематодозы, цестодозы	40	0,3
	трематодозы	30	0,4-0,6
Овцы, козы	нематодозы, цестодозы	50	0,2
	трематодозы	40	0,3
Свины	нематодозы	25	0,4
Собаки	нематодозы, цестодозы	15	0,9
	трематодозы	10	1
Куры	нематодозы	25	0,4

Для скота, который пасется на пастбищах, лечебно-профилактическую дегельминтизацию проводят в начале и в конце стойлового периода. При заболевании жвачных животных фасциолезом препарат используют в любое время года. В зависимости от интенсивности инвазии, которую определяют по среднему количеству яиц фасциол в пяти пробах фекалий, препарат применяют в следующих дозах на 10 кг массы тела:

- до 4 яиц (слабая интенсивность) — 1,3 г;
- 5-10 яиц (средняя интенсивность) — 1,5-1,7 г;
- более 10 яиц (сильная интенсивность) — 1,7-2 г.

Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол, первую профилактическую дегельминтизацию проводят через 2-2,5 месяца после окончания пастбищного периода, а повторную — не позднее чем за 10-15 дней до выгона животных на пастбище.

Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через 10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур — через 20 суток, молоко — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 3 и 10 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от -30 до +30 °С.

Срок годности

3 года.