

## Бровальзен эмульсия

эмульсия для перорального применения



ВОДО-РАСТВОРИМЫЙ



### Состав

1 мл препарата содержит:  
альбендазол — 75 мг

### Описание

Эмульсия белого или сероватого цвета, без запаха.

### Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия из группы бензимидазолов. Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные реакции, что вызывает гибель паразитов.

### Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, собак, котов, пушных зверей, кур** при поражении зрелыми и незрелыми трематодами *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium lanceatum*, нематодами ЖКТ и легких *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Dictyocaulidae* spp., *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Ostertagias* spp., *Strongyloides* spp., *Trichostrongylus* spp., *Trichuris* spp. и пр., цестодами *Avitellina centripunctata*, *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Thysaniezia giardi*.

### Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.

### Способ применения и дозы

Перед применением препарат тщательно взбалтывают и добавляют в воду либо корм. Лечебную смесь дают однократно индивидуально или групповым методом в начале утреннего кормления. Жвачным животным смесь принудительно выпаивают из резиновой или пластиковой бутылки, в которую предварительно добавляют две трети теплой воды, препарат и взбалтывают. Другим видам животных дозу препарата смешивают с влажным кормом или добавляют к трети суточной нормы воды и выпаивают групповым методом. Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных	Заболевания	Доза, мл / 10 кг массы тела
Крупный рогатый скот	нематодозы, цестодозы	1
	трематодозы	1,3–2
Овцы, козы	нематодозы, цестодозы	0,7
	трематодозы	1
Свиньи	нематодозы	1,3
Лошади и другие однокопытные	нематодозы, цестодозы	0,7
Собаки, коты, пушные звери	нематодозы, цестодозы	3
	трематодозы	3,5
Куры	нематодозы	1,3

При заболевании жвачных животных фасцилезом препарат используют в любое время года. Учитывая, что альбендазол малоэффективен против личинок фасциол, первую профилактическую дегельминтизацию проводят через 2–2,5 месяца после окончания пастбищного периода, а повторную — не позднее чем за 10–15 дней до выгона животных на пастбище.

### Предостережения

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота, овец, коз на мясо разрешается через 7 суток, свиней — через 10 суток, кур — через 2 суток. Людям употреблять в пищу печень, легкие, сердце свиней можно через 35 суток, жвачных животных и кур — через 20 суток, молоко — через 2 суток.

### Упаковка

Полимерные флаконы по 50, 100, 300, 1000 мл.

### Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +30 °С.

### Срок годности

3 года.