

Бровамаст 2Д

суспензия для интрацистернального применения



Состав

10 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:
кловксациллина натриевая соль — 300 мг
неомицина сульфат — 150 мг
сульфатаiazол натрия — 500 мг

Описание

Жидкость белого или светло-кремового цвета, маслянистая.

Фармакологические свойства

Кловксациллин — бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов, активен против грамположительных бактерий, вызывающих маститы, стрептококков *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, резистентных и чувствительных к пенициллину стафилококков и *Corynebacterium pyogenes*.

Неомицина сульфат относится к группе природных аминогликозидов, которые образуются актиномицетами. Антибиотик широкого спектра антимикробного действия, активен против грамотрицательных бактерий и кокков *E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Meningococcus*, грамположительных микроорганизмов *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Enterococcus*. Бактерицидное действие антибиотика обусловлено угнетением синтеза белка микробных клеток.

Сульфатаiazол натрия относится к сульфаниламидам резорбтивного действия, обладает высокой антимикробной активностью против стрептококков, менингококков, кишечной палочки, сальмонелл, пастерелл и пр.

Показания

Лечение дойных **коров** при серозном, катаральном, фибринозном, гнойном, субклиническом мастите.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата. Не применять более 5–7 дней.



Способ применения и дозы

Препарат применяют 2 раза в день после тщательного сдаивания большой доли вымени и проведения его асептической обработки. Перед введением суспензию подогревают до температуры тела животного и тщательно взбалтывают до однородной консистенции. После этого 10 мл препарата медленно вводят в молочный канал с помощью шприца-тубы или катетера и шприца и массируют сосок снизу вверх для распределения препарата в молочной цистерне вымени. Курс лечения — 2–3 дня.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 7 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 72 часа. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Шприцы-тубы по 10 мл (по 12 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +25 °С.

Срок годности

1,5 года.