

## Бровамаст С

суспензия для интрацистернального применения



### Состав

5 мл препарата (1 шприц-туба) содержат:  
кловксациллина бензатин — 600 мг

### Описание

Жидкость светло-желтого цвета, маслянистая.

### Фармакологические свойства

Кловксациллина бензатин — синтетическое соединение, производная из группы изоксазолил пенициллина. Препятствует синтезу внешней оболочки клеточной мембраны микроорганизмов, обладает бактерицидными свойствами. Действует против грамположительных бактерий *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Str. uberis*, *Str. dysgalactiae*, *Corinebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens* и грамотрицательных бактерий *Neisseria spp.*

### Показания

Профилактика **сухостойных коров** при субклиническом и клиническом мастите.

### Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к кловксациллина бензатину, лактирующим коровам и тем, которым осталось до отела менее 28 суток.



### Способ применения и дозы

Препарат применяют в первый день запуска коров после тщательного сдвоявания и проведения асептической обработки вымени. Перед введением суспензию подогревают до температуры тела животного и тщательно взбалтывают до однородной консистенции. После этого препарат медленно вводят в молочный канал с помощью шприца-тубы или катетера и шприца и массируют сосок снизу вверх для распределения препарата в молочной цистерне вымени. Профилактическая доза составляет 5 мл препарата в каждую долю вымени.

### Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 28 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 96 часов. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

### Упаковка

Шприцы-тубы по 5 мл (по 12 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 50, 100 мл.

### Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +20 °С.

### Срок годности

1,5 года.