

Брованол Д

порошок для перорального применения



Состав

1 г препарата содержит:

никлозамид — 230 мг

оксибендазол — 30 мг

леваamisола гидрохлорид — 40 мг

Описание

Порошок желтоватого цвета.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия.

Никлозамид при пероральном применении не всасывается из ЖКТ и при контакте с ленточными гельминтами тормозит оксидационно-фосфоролитические процессы, что приводит к ослаблению и быстрой гибели сколексов и сегментов паразитов, которые частично перевариваются и выводятся из организма животных.

Оксибендазол нарушает метаболизм глюкоидов у нематод, блокируя образование АТФ, что вызывает паралич и гибель паразитов на всех стадиях развития через несколько часов после введения препарата.

Леваamisола усиливает нематодоцидное действие оксибендазола и является эффективным иммуномодулятором. При дальнейшей вакцинации способствует образованию поствакцинального иммунитета высокого уровня.

Показания

Лечение и профилактика смешанных инвазий ЖКТ, вызванных:

- **собаки, коты** — личинками и взрослыми гельминтами *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Diphylobothrium latum*, *D. minus*, *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Taenia hydatigena*, *T. multiceps*;
- **куры, гуси, утки** — *Ascaridia galli*, *A. dissimilis*, *A. columbae*, *Capillaria anseris*, *C. anatis*, *C. contorta*, *Syngamus trachea*, *Streptocara crassicauda*, *Hymenolepis gracilis*, *H. paracompressa*, *Fimbriaria fasciolaris*, *Tetrameris fassisipina*.

Противопоказания

Не назначать животным при атонии кишечника.



Способ применения и дозы

Перед применением препарат смешивают с кормом в следующих дозах:

- **собаки, коты** — 1 г на 10 кг массы тела, с третью утренней нормы корма;
- **куры** — 1 г на 10 кг массы тела, курс — 3 дня;
- **гуси, утки** — 5 г на 10 кг массы тела, курс — 3 дня.

Предостережения

Не превышать указанных доз. У некоторых животных при сильной инвазии вследствие интоксикации переваренными частями гельминтов возможно появление крапивницы и зуда в области прямой кишки, беспокойства, диареи, рвоты. Эти симптомы быстро исчезают без специального лечения.

Упаковка

Полимерные пакеты по 5 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре до +25 °С.

Срок годности

3 года.