

Брованол плюс

таблетки для перорального применения



Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
празиквантел — 50 мг
ивермектин — 2 мг
леваamisола гидрохлорид — 38 мг

Описание

Таблетки белого или сероватого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия. Празиквантел тормозит мышечную иннервацию и нарушает мембранно-пропускные функции клеток цестод и трематод, что приводит к их гибели. Ивермектин усиливает связь ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) со специальными рецепторами на нервных окончаниях паразита (нематод, паукообразных, насекомых и личинок слепней), блокируя иннервацию паразита и вызывая его паралич и гибель. Левамизол является эффективным иммуномодулятором и при дальнейшей вакцинации способствует образованию поствакцинального иммунитета высокого уровня.

Показания

Лечение и профилактика **собак** при поражении блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами, личинками и половозрелыми нематодами, цестодами и некоторыми трематодами — *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*, *D. minus*, *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichocephalus vulpispis*, *Taenia hydatigena*, *T. multiceps*, *Uncinaria stenocephala*, *Opisthorchis tenuicollis*, *O. viverrini*, *O. sinensis*, *Paragonimus westermani*, *Mesocoeloides lineatus*, *M. litteratus*, *M. corti*, *M. petrovi*, *Dirofilaria immitis*, *D. repens*, половозрелыми формами *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis* и пр.

Если кожные паразиты у животных отсутствуют, для профилактической дегельминтизации применяют Брованол Д.

Противопоказания

Не назначать собакам породы колли, шелти, бобтейл и щенкам в возрасте до 6 месяцев.



Способ применения и дозы

Перед применением таблетки измельчают, смешивают с третьей частью корма и дают утром.

Лечебная доза составляет 1 таблетка на 10 кг массы тела. Для животных в возрасте до 1,5 лет рассчитанную дозу делят на 2 части и дают с интервалом в сутки. При наличии демодекоза препарат используют повторно через 10–12 дней, одновременно с препаратами для симптоматической терапии.

Предостережения

Не превышать рекомендованных доз. Применять только по назначению ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре до +25 °С.

Срок годности

3 года.