

Бровермектин 1%

раствор для инъекций



Состав

1 мл препарата содержит:
ивермектин — 10 мг

Описание

Жидкость бесцветная или светло-желтого цвета, прозрачная, вязкая, без механических включений, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные соединения членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами:

- крупный рогатый скот:** ЖКТ — половозрелые и личинки 4 стадии *Nematodirus helvetianus*, *Ostertagia ostertagi*, *O. lyrata*, *Bunostomum trigonocephalum*, *B. phlebotomum*, *Haemonchus placei* (личинки 3 и 4 стадии), *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia pectinata*; легкие — половозрелые и личинки 4 стадии *Dictyocaulus viviparus*; полости — стадии микросетарий *Setaria labiato-papillosa*; кожа — половозрелые *Paraphilaria bovicola*, личинки подкожного овода 1 и 2 стадий *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, чесоточные клещи *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes bovis*, клещи *Demodex bovis*, власоеды *Bovicola bovis*, вши *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*;
- овцы, козы:** ЖКТ — половозрелые и личинки 3 и 4 стадий *Bunostomum trigonocephalum*, *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *Chabertia ovina*, половозрелые *Trichostrongylus axei*, половозрелые и личинки 4 стадии *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichuris ovis*; легкие — половозрелые и личинки 4 стадии *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens*; носоглотка — личинки овода всех стадий *Oestrus ovis*; кожа — чесоточные клещи *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes bovis*, *S. caprae*, *Chorioptes ovis*, *Ch. caprae*, власоеды *Bovicola ovis*, *B. caprae*, вши *Linognathus ovillus*, *L. pedalis*, *L. caprae*;
- свины:** ЖКТ — половозрелые и личинки 4 стадии *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, половозрелые *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*; легкие — *Metastrongylus* spp.; почки — половозрелые и личинки 4 стадии *Stefanurus dentatus*; кожа — вши *Haematopinus suis*, клещи *Sarcoptes suis*, *S. parvula*, *Demodex phylloides*;



- лошади:** ЖКТ — *Ascaridae*, *Strongylidae*, *Strongyloididae*, *Oxyurata*, *Trichonematidae*, *Spiruridae*; легкие — *Dictyocaulus* spp.; кожа — *Paraphilaria multipapillosa*, *Onchocerca cervicalis*, личинки слепней — *Gasterophilus* spp., *Rhinoestrus purpureus*;
- собаки:** ЖКТ — *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*; кожа — клещи *Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Cheyletiella jasguri*, *Demodex canis*, вши *Linognathus setotus*;
- кролики:** нематоды *Passalurus ambiguus*, клещи *Psoroptes cuniculi*;
- птица (куры, индейки):** клещи *Knemidocoptes mutans*, *K. pilae*, *K. gallinae*.

Противопоказания

Не назначать коровам в период лактации и за 28 дней до отела, жеребяткам в возрасте до 1 года, спортивным лошадям, собакам малых пород, курам-несушкам и истощенным животным всех видов. Не использовать щенкам до 6 недель, собакам пород колли, шелти, бобтейл и их помесей.

Способ применения и дозы

Препарат применяют однократно, только подкожно в область лопатки, свиньям — в область шеи.

Вид животных	Доза, мл / 10 кг массы тела
Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, кролики	0,2
Свины	0,3
Собаки	0,2–0,4
Птица (куры, индейки)	0,1 (на птицу), 0,2 (при массе более 5 кг)

При лечении чесотки, демодекоза, хориоптоза препарат вводят повторно через 8–10 суток. Инъекцию более 5 мл делят на две части и вводят в разные места.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 28 дней. Мясо, полученное раньше указанного срока, используют только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки.

Упаковка

Стеклоампулы по 1 мл, стеклянные флаконы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), по 20, 50, 100 мл, полимерные ампулы по 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +8 до +25 °С.

Срок годности

3 года.