

ЦИПРОВЕТ КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ



Применение:

Для лечения и профилактики офтальмологических заболеваний для собак и кошек

Форма выпуска:

Полимерный флакон-капельница 10 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка.

Преимущества:

- Широкий спектр антимикробного действия.
- Эффективен, когда другие препараты бессильны.

Состав и фармакологические свойства.

Лекарственный препарат в качестве действующего вещества содержит ципрофлоксацина гидрохлорид – 0,45%.

Препарат обладает бактерицидным и противовоспалительным свойством, имеет широкий спектр антимикробного действия, высокоэффективен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая хламидии, микоплазмы, золотистый стафилококк и синегнойную палочку, а также штаммы, резистентные к метициллину и гентамицину.

При местном применении ципрофлоксацин хорошо проникает в роговицу и переднюю камеру глаза, особенно при нарушении эпителиального слоя роговицы.

Показания к применению.

С лечебной целью при острых и хронических конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах, кератитах, язвах роговицы, септических иридоциклитах, блефаритах. В целях профилактики инфекционных заболеваний глаз после травм и попадания инородных тел, а также в глазной хирургии в предоперационный и после-операционный периоды.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам. Капли глазные не следует применять котятам и щенкам младше 7-дневного возраста. Ципровет капли глазные следует применять с осторожностью животным с атеросклерозом сосудов головного мозга и нарушением мозгового кровообращения.

Дозы и порядок применения.

Ципровет капли глазные закапывают в конъюнктивальную полость пораженного глаза кошкам по 1 капле, собакам по 1–2 капли четыре раза в день в течение 7–14 суток до клинического выздоровления животного. При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого закапывают 3–4 капли препарата, затем марлевым тампоном тщательно удаляют все отделяемое и корочки. После этого закапывают 1–2 капли лекарственного препарата и проводят лечение.

Побочные явления.

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. В редких случаях препарат может вызвать легкую болезненность и гиперемию конъюнктивы, зуд, слезотечение, которые проходят через 5 минут.

Хранение.

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 до 25°C. Срок хранения – 3 года со дня производства; после вскрытия флакона – 30 суток.

Форма выпуска.

Полимерный флакон-капельница 10 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка.