


Катозал®



10%

Розчин для ін'єкцій
Раствор для инъекций

100 мл



Стимулятор обміну речовин у всіх видів тварин
Стимулятор обмена веществ у всех видов животных

Ⓢ Склад. 100 мл препарату містять діючі речовини :
бутирофосфан - 10,0 г, ціанокобаламін - 0,005 г.
Спосіб застосування та дозування: Внутрішньовенне,
внутрішньом'язове і підшкірно або з питною водою (птиця).
лошата і телята — 5-12 мл,
вівці та кози — 2,5-8 мл,
ягнята — 1,5-2,5 мл,
свині — 2,5-10 мл,
поросята — 1-2,5 мл,
собаки — 0,5-5,0 мл,
коти і курлові звіри — 0,5-2,5 мл,
кури і курчата — 1-1,5 мл на 1 л води;
бройлери і кури-несучки — 2-3 мл на 1 л води. При
хронічних захворюваннях тваринами вводять половину дози.
За необхідності лікування повторюють через 5-14 днів.
Зберігати за температури від 5 до 25 СС. Тільки для
застосування у ветеринарії.
Власник реєстраційного посвідчення: Байер Енімал Хелс
ГмбХ, D-51368Левеверкузен, Німеччина
Виробник: Байер Хелс Кеа ЛЛС, (Сполучені Штати
Америки), Шоуні Мишн Паквей 12707, Шоуні, Канзас 66201-
0390
РП в Україні: AA-0666-01-12

Ⓢ Состав. 100 мл препарата содержит действующие
вещества: бутирофосфан - 10,0 г, цианокобаламин - 0,005 г.
Способ применения и дозировка: внутривенное,
внутримышечно и подкожно или с питьевой водой
(птица).
лошадь и крупный рогатый скот - 10-25 мл
жеребят и телят - 5-12 мл,
овцы и козы - 2,5-8 мл,
ягнята - 1,5-2,5 мл,
свиньи - 2,5-10 мл
поросята - 1-2,5 мл,
собаки - 0,5-5,0 мл,
кошки и пушные звери - 0,5-2,5 мл,
куры и цыплята - 1-1,5 мл на 1 л воды,
бройлера и кури-несушки - 2-3 мл на 1 л воды. При
хронических заболеваниях животных вводят половину
дозы. При необходимости лечение повторяют через 5-14
суток. Хранить при температуре от 5 до 25 СС. Только для
применения в ветеринарии.
Владелец регистрационного свидетельства: Байер
Энимал Хелс ГмбХ, D-51368Левеверкузен, Германия
Производитель: Байер Хелс Кеа ЛЛС, (Соединенные
Штаты Америки), Шоуні Мишн Паквей 12707, Шоуні,
Канзас 66201-0390

Bayer

Сепаратне
Дата виготовлення/Дата производства:
Примітки до Л.Сторінки:

Катозал® 10%
(розчин для ін'єкцій)
листівка–вкладка

Опис

Прозорий розчин рожевого кольору .

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

бутафосфан - 10,0;

ціанокобаламін - 0,005.

Допоміжні речовини: метил-4-гідроксибензоат, гідроокис натрію, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

ATCvet QA12C, інші мінеральні добавки (QA12CX91, бутафосфан).

Катозал® 10% – стимулятор обміну речовин та тонізуючий засіб.

Діючі речовини, що входять до складу препарату Катозал® 10%, беруть участь у синтезі протеїну, тим самим прискорюють ріст тварин і відновлюють втомлені м'язи, знижують вплив стресу та підвищують загальну резистентність організму, стимулюють процеси кровотворення, сприяють засвоєнню поживних речовин.

Фосфор, який входить до складу препарату, впливає майже на всі асиміляційні процеси, які відбуваються в організмі. Він міститься в такій формі, яка швидко виділяється з організму. Органічні препарати фосфору, завдяки їх виключно фізіологічному типу дії, є прекрасними загальними метаболічними стимуляторами. Це підтверджується тим фактом, що побічні ефекти, такі як серцебиття, тремор, підвищене потовиділення і т.п., які часто спостерігаються при застосуванні інших тонізуючих засобів, не спостерігаються. Крім того, здатність до реагування органів з гладкою мускулатурою підвищується.

Катозал® 10% в терапевтичних дозах діє в основному на скелетну систему, стимулює органи з гладкими м'язами (сечовидільна система, жовчний міхур) та серцевий м'яз. Гострі та хронічні метаболічні розлади добре корегуються Катозалом 10 %.

Вітамін В₁₂ (ціанокобаламін) стимулює білкокий, вуглеводневий та жировий обмін, позитивно впливає на червоні кров'яні тілця, стимулює їх ріст.

Застосування

Тонізуючий засіб, який стимулює обмін речовин у коней, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів, хутрових звірів та птиці при:

- порушенні обміну речовин, викликаних поганою годівлею, утриманням або різними захворюваннями;
 - порушенні годівлі, розвитку і внаслідок хвороб, при вирощуванні молодняка;
 - стимуляції родової діяльності та як допоміжний засіб при кальціємії;
 - післяродових захворюваннях (виснаженнях), після важких родів, а також, як допоміжний засіб при лікуванні неплідності;
 - тетанічних синдромах і парезі;
 - ослабленому стані у тварин;
 - вторинній анемії, анеміях при гельмінтозах;
- а також для:
- підвищення резистентності організму;
 - прискорення і скорочення процесу линьки у птиці, а також при канібалізмі;
 - підвищення м'язової активності здорових тварин.

Дозування

Внутрішньовенне, внутрішньом'язово і підшкірно або з питною водою (птиця).

Дози становлять:

коні і велика рогата худоба — 10-25 мл;

лошата і телята — 5-12 мл;

вівці та кози — 2,5-8 мл;

ягнята — 1,5-2,5 мл;
свині — 2,5-10 мл;
поросята — 1-2,5мл;
собаки — 0,5-5,0 мл;
коти і хутрові звірі — 0,5-2,5 мл.

За необхідності препарат вводять повторно наступної доби.

Для птиці Катозал® 10 % додається до питної води з розрахунку:

кури і курчата — 1-1,5 мл на 1 л води;
бройлери і кури-несучки — 2-3 мл на 1 л води. При хронічних захворюваннях тваринам вводять половину дози.

За необхідності лікування повторюють через 5-14 діб.

Протипоказання

Невстановлені.

Застереження

Немає.

Форма випуску

Темні скляні флакони по 100 мл. Препарат Катозал® 10 % випускають у вигляді стерильного розчину у герметично закритих флаконах.

Зберігання

У недоступних для дітей місцях окремо від кормів та продуктів харчування за температури від 5 до 25 °С. Відкривати безпосередньо перед використанням.

Термін придатності

5 років. Після відкриття флакону – 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

Виробник готового продукту

Байер Хелс Кеа ЛЛС
(Сполучені Штати Америки)
Шоуні Мішн Паквей 12707
Шоуні , Канзас 66201-0390

Bayer Health Care LLC
(United States of America)
12707, Shawnee Mission Parkway, Shawnee
Kansas 66201-0390

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Катозал® 10%

2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

бутафосфан - 10,0;

ціанокобаламін - 0,005.

Допоміжні речовини: метил-4-гідроксibenзоат, гідроокис натрію, вода для ін'єкцій.

3. Фармацевтична форма

Розчин для ін'єкцій

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QA12C, інші мінеральні добавки (QA12CX91, бутафосфан).

Катозал® 10% – стимулятор обміну речовин та тонізуючий засіб.

Діючі речовини, що входять до складу препарату Катозал® 10%, беруть участь у синтезі протеїну, тим самим прискорюють ріст тварин і відновлюють втомлені м'язи, знижують вплив стресу та підвищують загальну резистентність організму, стимулюють процеси кровотворення, сприяють засвоєнню поживних речовин.

Фосфор, який входить до складу препарату, впливає майже на всі асиміляційні процеси, які відбуваються в організмі. Він міститься в такій формі, яка швидко виділяється з організму. Органічні препарати фосфору, завдяки їх виключно фізіологічному типу дії, є прекрасними загальними метаболічними стимуляторами. Це підтверджується тим фактом, що побічні ефекти, такі як серцебиття, тремор, підвищене потовиділення і т.п., які часто спостерігаються при застосуванні інших тонізуючих засобів, не спостерігаються. Крім того, здатність до реагування органів з гладкою мускулатурою підвищується.

Катозал® 10% в терапевтичних дозах діє в основному на скелетну систему, стимулює органи з гладкими м'язами (сечовидільна система, жовчний міхур) та серцевий м'яз. Гострі та хронічні метаболічні розлади добре корегуються Катозалом 10 %.

Вітамін В₁₂ (ціанокобаламін) стимулює білковий, вуглеводневий та жировий обмін, позитивно впливає на червоні кров'яні тіลця, стимулює їх ріст.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коні, велика рогата худоба, свині, кози, вівці, собаки, коти, хутрові звірі, птиця.

5.2 Показання до застосування

Тонізуючий засіб, який стимулює обмін речовин у коней, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів, хутрових звірів та птиці при:

- порушенні обміну речовин, викликаних поганою годівлею, утриманням або різними захворюваннями;
 - порушенні годівлі, розвитку і внаслідок хвороб, при вирощуванні молодняка;
 - стимуляції родової діяльності та як допоміжний засіб при кальціемії;
 - післяродових захворюваннях (виснаженнях), після важких родів, а також, як допоміжний засіб при лікуванні неплідності;
 - тетанічних синдромів і парезі;
 - ослабленому стані у тварин;
 - вторинній анемії, анеміях при гельмінтозах;
- а також для:
- підвищення резистентності організму;
 - прискорення і скорочення процесу линьки у птиці, а також при канібалізмі;
 - підвищення м'язової активності здорових тварин.

5.3 Протипоказання

Невстановлені.

5.4 Побічна дія

Немає.

5.5 Особливі застереження при використанні

Застережень немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Внутрішньовенне, внутрішньом'язово і підшкірно або з питною водою (птиця).

Дози становлять:

коні і велика рогата худоба — 10-25 мл;

лошата і телята — 5-12 мл;

вівці та кози — 2,5-8 мл;

ягнята — 1,5-2,5 мл;

свині — 2,5-10 мл;

поросята — 1-2,5мл;

собаки — 0,5-5,0 мл;

коти і хутрові звірі — 0,5-2,5 мл.

За необхідності препарат вводять повторно наступної доби.

Для птиці Катозал® 10 % додається до питної води з розрахунку:

кури і курчата — 1-1,5 мл на 1 л води;

бройлери і кури-несучки — 2-3 мл на 1 л води. При хронічних захворюваннях тваринам вводять половину дози.

За необхідності лікування повторюють через 5-14 діб.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не спостерігали.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Молоко та м'ясо тварин, яким застосовували Катозал ® 10%, може застосовуватися в їжу людям без обмежень.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невстановлені.

6.2 Термін придатності

5 років. Після відкриття флакону – 28 діб.

6.3 Особливі заходи зберігання

У недоступних для дітей місцях окремо від кормів та продуктів харчування за температури від 5 до 25 °С. Відкривати безпосередньо перед використанням.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Темні скляні флакони по 100 мл. Препарат Катозал® 10 % випускають у вигляді стерильного розчину у герметично закритих флаконах.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та його залишки утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

Байер Хелс Кеа ЛЛС
(Сполучені Штати Америки)
Шоуні Мішн Паквей 12707
Шоуні , Канзас 66201-0390

Bayer Health Care LLC
(United States of America)
12707, Shawnee Mission Parkway,
Shawnee Kansas 66201-0390

9. Додаткова інформація