

**Флаконы
по 10, 100 мл**



ЦЕФТИФУР-50

суспензия для инъекций

Состав

1 мл препарата содержит действующее вещество цефтиофур (в форме гидрохлорида) – 50 мг; вспомогательные вещества.

Фармакологические свойства

Цефтиофур – антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения. Обладает широким спектром действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу, и некоторые анаэробы, в том числе: *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*, *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Actinomyces pyogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus bovis*, *Klebsiella spp.*, *Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Bacillus spp.*, *Proteus spp.*, *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas asaccharolytica (Bacteroides melaninogenicus)*. Механизм бактерицидного действия цефтиофура состоит в угнетении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, принимающих участие в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

Применение

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз при остром послеродовом метрите, мастите, некробактериозе (панариции, гниении копыт), а также при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

Лечение свиней при остром метрите, при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

Лечение собак и кошек при заболеваниях пищеварительного тракта (энтерит, гастроэнтерит, гастроэнтероколит), органов дыхания (бронхит, бронхопневмония, ринит) и мочеполовой системы (метрит, эндометрит, мастит, агалактия, цистит, уретрит, пиелонефрит), суставов, кожи и мягких тканей; острых и хронических отитах, операционных, раневых, послеродовых и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

Способ применения и дозы

Крупный рогатый скот, овцы, козы: при лечении респираторных заболеваний – внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток; при лечении острого некробактериоза – внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3 суток; при лечении острого послеродового метрита (через 10 суток после отела) – подкожно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 суток; при лечении мастита – внутримышечно в дозе 1-2 мл препарата на 50 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 суток.

Свины: внутримышечно в дозе 1 мл препарата на 16 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3 суток.

Собаки, кошки: внутримышечно в дозе 0,5 мл препарата на 10 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 суток.

Период выведения (каренции)

Забой продуктивных животных на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается без ограничений. Полученное до указанного срока мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Срок годности

2 года. После первого отбора препарата из флакона – 28 суток при температуре от 5 до 25° С.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 5 до 25° С.

www.biotestlab.ua

Антибиотики инъекционные