

Цефтиоклин

суспензия для инъекций



НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ



Состав

1 мл препарата содержит:
цефтиофура гидрохлорид — 50 мг

Описание

Жидкость светло-желтого или светло-коричневого цвета, однородная.

Фармакологические свойства

Цефтиофура гидрохлорид — антибиотик III поколения из группы цефалоспоринов с широким спектром антибактериального действия. Механизм действия заключается в угнетении синтеза клеточной стенки бактерий.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, включая виды, продуцирующие бета-лактамазу, — *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp., *Actinomyces pyogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. bovis*, *Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*):

- **крупный рогатый скот** — послеродовой эндометрит, некробактериоз, заболевания органов дыхания;
- **свиньи** — заболевания органов дыхания.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру и другим бета-лактамам антибиотикам.



Способ применения и дозы

Перед применением суспензию взбалтывают и вводят:

- **крупный рогатый скот** — подкожно или внутримышечно, 1 раз в сутки, в дозе 1 мл на 50 кг массы тела (1 мг цефтиофура гидрохлорид на 1 кг массы тела), курс лечения при заболеваниях органов дыхания — 3–5 дней, при некробактериозе — минимум 3 дня, при эндометрите — 5 дней;
- **свиньи** — внутримышечно, 1 раз в сутки, в дозе 1 мл на 16 кг массы тела (3 мг цефтиофура гидрохлорид на 1 кг массы тела), курс — 3–4 дня.

Предостережения

Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.

После последнего применения препарата забой крупного рогатого скота на мясо разрешается через 8 суток, свиней — через 5 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Период выведения для молока отсутствует.

Упаковка

Стеклянные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), 50, 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +25 °С.

После стерильного вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 15 суток.

Срок годности

2 года.