

## Описание

Прозрачная маслянистая жидкость от желтоватого до красно-коричневого цвета.

## Состав

1 мл препарата содержит действующее вещество:

фентион 200 мг.

## Фармакологические свойства

ATCvet QR53A, эктопаразитарные ветеринарные препараты для местного применения.

Фентион – инсектицид группы тиофосфорорганических соединений, механизм действия которого заключается в блокировании фермента ацетилхолинэстеразы в нервных синапсах паразита, что приводит к его гибели. Фентион плохо проникает через гематоэнцефалический барьер теплокровных животных, но при внешнем применении всасывается через кожу и проникает в кровь. Кровососные паразиты гибнут из-за попадания в их организм фентиона с кровью животных.

## Применение

Лечение и профилактика собак при поражении эктопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis*), вшами (*Linognathides spp.*), клещами (*Demodex canis*, *Otodectes cynotis*), влассоедами (*Trichodectes canis*), чувствительными к фентиону.

## Дозирование

Перед применением надломить кончик пипетки.

Препарат применяется внешне, путем нанесения на кожу животных на участке холки и вдоль позвоночника, в дозах:

- собаки массой тела от 3 до 10 кг - 1 пипетка по 0,5 мл препарата;
- собаки массой тела от 10 до 20 кг - 1 пипетка по 1 мл препарата;
- собаки массой тела от 20 до 30 кг - 3 пипетки по 0,5 мл препарата;
- собаки массой тела от 30 до 50 кг - 2 пипетки по 1 мл препарата;
- собаки массой тела более 50 кг - 3 пипетки по 1 мл препарата.

Препарат обеспечивает защиту от эктопаразитов в течение месяца (30 суток). Повторные обработки проводят через 3-4 недели.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к фентиону.

Не применять собакам возрастом до 4-х месяцев и массой тела до 3 кг.

Не применять ослабленным, больным и изможденным животным.

Не применять препарат беременным животным за неделю до родов.

## Предостережение

У чувствительных животных после обработки возможны осложнения (слюнотечение, беспокойство), которые быстро проходят. В редких случаях возможны аллергические явления (сыпь на коже, зуд и отеки). При их возникновении применение препарата прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию.

При работе с препаратом необходимо придерживаться общих правил личной гигиены и правил работы с ветеринарными препаратами. Обязательно после обработки животных тщательно вымыть руки с мылом.

В случае случайного отравления рекомендуется симптоматическая терапия. Антidot - атропина сульфат.

## Форма выпуска

Полимерные ампулы капельницы по 0,5; 1,0 мл, упакованные по 5 штук в картонную коробку.

Вторичная упаковка – картонная коробка.

## Хранение

Сухое темное, не доступное для детей и животных место отдельно от продуктов питания и кормов для животных при температуре 5-25°C.

Срок годности - 18 месяцев.