

Фенбендазолвет 5,5%

Ингредиенты: [Фенбендазол](#)

Применение: [Оральное](#)

Тип препарата: [Антигельминтный](#)



Описание

Порошок с цветом от белого к светло-серому.

Состав

- 1 гр препарата содержит действующее вещество:
Фенбендазол — 55 мг

Фармакологические свойства

Фенбендазол — антгельминтик с широким спектром действия, активен при нематодозах, цестодозах у разных видов животных, уничтожает также личинки и яйца паразитов.

Применение

Для профилактики и лечения при следующих гельминтозных заболеваниях:

- желудочно-кишечные гельминтозы: гемонхоз, нематодироз, хабертиоз, буностомоз, эзофагостомоз, остертагиоз, трихоцефалез, стронгилоидоз, неоаскаридоз, аскаридоз, токсокароз, анкилостомоз, унцинариоз, оксиуроз, деляфондиоз, альфортиоз, трихонематоз;
- легочные гельминтозы: диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, метастронгилез, пренозомоз;

- цестозы: мониезиоз, тизаниэдиоз, авителиноз, дипилидиоз, аноплоцефалидоз;
- трематоды: фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз, описторхоз.

Дозировка

Применяют препарат перорально однократно без применения диеты в следующих дозах:

Вид животных	Название заболевания	Доза из расчета на 10 кг живого веса		
		Фенбендазол 5,5%, г	По действующему веществу, мг	Кратность интервала между введением
Лошади	Параскароз, стронгилятоз, оксиуроз, трихонематоз, аноплоцефалитоз, триадонтофороз, параноплоцефалитоз, эзофагостомоз, гиолоцефалез	2,7	150	однократно
Жеребята	Стронгилоидоз	1,5	80	двукратно, через сутки
Крупный рогатый скот	Стронгилоидоз, стронгилятоз, диктиокаулез, неоаскароз, трихостронгилез, гемонхоз, остертагиоз, нематодироз, хабертиоз	1,5	80	однократно
Овцы, козы	Неоаскароз, стронгилоидоз, трихостронгилоидозы, коопериоз, буностомоз, эзофагостомоз	0,9	50	однократно

	Диктиокаулез	1,8	100	однократно
	Мониезиоз, тизаниезиоз	1,8	100	однократно
Свиньи	Аскароз, трихуроз	1,8	100	двукратно, через сутки
	Эзофагостомоз, стронгилоидоз	0,75	40	двукратно, через сутки
Собаки, кошки	Анкилостомоз, трихуроз, токсокароз, токсокароз, унцинариоз	7,2	400	троекратно, через сутки
Домашние птицы	Аскаридиоз, амидостомоз	1,8	100	4-5 раз, ежедневно

Свиньям при аскаридозе через сутки повторить в той же дозе.

Противопоказания

Не установлено.

Предостережения

Повышенная чувствительность к препаратам группы бензимидазолов.

Забой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 дней, использование молока для пищевых целей — через 5 дней после последнего применения препаратов.

Форма выпуска

Полимерные пакеты по 2, 100, 1000 грамм.

Хранение

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше + 25°C.

Срок хранения — 24 месяца.