

Кальценон
(раствор для инъекций)
листок-вкладыш

Описание

Прозрачный раствор от слегка желтого до желтого с коричневатым оттенком окраски.

Состав

100 мл препарата содержат действующие вещества (г):

кальция глюконат	32,82;
кальция глицерофосфат	8,13;
магния хлорид гексагидрат	4,18.

Вспомогательные вещества: кислота борная, натрия цитрат, вода для инъекций.

Фармакологические свойства

Действие препарата Кальценон определяется эффектом компонентов, которые входят в его состав.

Кальций стимулирует функцию сердечнососудистой системы, способствует уменьшению дисперсности белка, проницаемости кровеносных сосудов, активизирует процессы свертывания крови, участвует в формировании костной ткани (предупреждает риск развития рахита, остеодистрофии), регулирует процессы нервной проводимости и мышечных сокращений, имеет общеукрепляющий, антитоксичный эффекты.

Фосфор является составляющей нуклеопротеидов и фосфолипидов, стимулирует процессы ассимиляции, положительно влияет на обмен веществ в тканях организма.

Магний способствует обмену фосфора и углеводов как кофермент. Его недостаточность в организме животного вызывает чрезмерное возбуждение. При комплексном введении магний блокирует нервно-мышечную трансмиссию и предупреждает развитие судорог.

Применение

Кальценон назначают с целью профилактики и лечения сельскохозяйственных животных при:

- тетаниях (в период беременности, лактации, при транспортировке, выпасе и т. д.);
- послеродовых парезах и парезах, которые вызваны недостатком кальция и фосфора;
- нарушении обмена кальция, фосфора, магния (рахит, остеодистрофия, остеомаляция, беременность и др.);
- ацетонемии;
- отравлении свинцом, фтором, щавелевой кислотой (как вспомогательная терапия при комплексном лечении);
- токсикозе, аллергии, геморрагическом диатезе, гематурии, гемоглобинурии.

Дозировка

Дозировка и способы введения препарата приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Виды животных	Доза препарата в мл на одного животного	Способ введения
кони с массой тела до 500 кг	80-100	внутривенно
крупный рогатый скот с массой тела до 500 кг (любого возраста)	80-100	внутривенно внутримышечно подкожно
овцы, козы	15-25	внутривенно, внутримышечно подкожно
свиньи	15-25	внутривенно, внутримышечно
поросята	2-3	внутримышечно, дважды с интервалом 24 часа

Кальценон вводят однократно. Возможно повторное применение препарата через 24 часа в тех же дозах.

Крупному рогатому скоту подкожно не вводить в одно и то же место более 50 мл препарата, внутримышечно – более чем 25 мл. Овцам и козам внутримышечно в одно и то же место не вводить более 15 мл препарата. Внутривенно препарат вводят медленно и равномерно.

Противопоказания

Противопоказан при гиперкальциемии, ацидозе, тяжелых нарушениях функций почек, мерцающей аритмии предсердий, повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Кальценон не рекомендуется назначать животным одновременно с препаратами дигиталиса, с витамином D и его аналогами.

Побочное действие

Данных нет.

Предостережения

В случаях гиперкальциемии (при передозировке) могут возникать: анорексия, боли в мышцах, тошнота, рвота, жажда, полиурия. В особо тяжелых случаях гиперкальциемия может вызывать брадикардию и аритмию. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска

Раствор в стеклянных бутылках по 100 мл.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Для применения в ветеринарной медицине!

Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта

ПАО «Галичфарм»,

ул. Опрышковская, 6/8, г. Львов, Украина, 79024