

Карнивет-L® (раствор для перорального применения)

ингредиенты: КАРНИТИН

применение: ОРАЛЬНОЕ

тип препарата: АНТИСТРЕССОВЫЙ (КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ)

ОПИСАНИЕ

Маслянистая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, допускается появление незначительного осадка.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

L-Карнитина гидрохлорид- 50,0 мг;

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

L-Карнитина гидрохлорид – стимулятор метаболических процессов, продуктов биосинтеза лизина и метионина.

Применение препарата приводит к повышению выносливости организма, улучшению функции сердца, уменьшению подкожного жира, увеличения мышечной массы за счет общего улучшения обменных процессов в клетках, улучшение проникновения в клетки витаминов, минералов и выведения продуктов распада. Препарат снижает риск возникновения жировой дистрофии печени, нефроза, миокардоза, предотвращает возникновение стрессов (теплового, транспортного и др.). Повышает аппетит и усвоение кормов, улучшает пищеварение и всасывание жиров, что особенно важно в период интенсивного роста животных и птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяют препарат для нормализации обмена веществ, повышение общей резистентности и производительности, профилактики и лечения в стрессовый период, ускорения роста при откорме телят, коз, овец, свиней, коней, птицы, кролей.

ДОЗИРОВКА

Препарат применяют перорально в течение 5-10 суток в дозах:

Телята на откорме: 1мл препарата на литр жидкого корма;

Овцы, козы, свиньи, лошади: 1мл препарата на 1 литр питьевой воды;

Птица, кроли: 1мл препарата на 1 литр питьевой воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять вместе с антибиотиками тетрациклиновой группы.

Не смешивать с вакцинами, которые выпаиваются с питьевой водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять более чем 21 день.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы из нейтрального стекла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 10, 20 и 1000 мл.

Полимерные флаконы (канистры) по 1 и 5 л.

ХРАНЕНИЕ

В сухом темном, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов, в упаковке производителя о при температуре от 5 °С до 25°С.

Срок годности — 2 года.

Срок годности после первого открытия первичной тары при соблюдении условий хранения и плотной укупорки 28 суток.