

Комбитрем эмульсия

эмульсия для перорального применения



ВОДО-РАСТВОРИМЫЙ



Состав

1 мл препарата содержит:
триклабендазол — 50 мг
альбендазол — 100 мг

Описание

Жидкость белого или кремового цвета, без запаха.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия. Эффективен против зрелых и личиночных форм фасциол на ранней стадии инвазии и дикроцелий *Fasciola hepatica*, *F. gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*, всех видов нематод ЖКТ и легких *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Marshallagia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Chabertia* и пр., половозрелых цестод *Moniezia* и личинок цестод *Echinococcus*, *Alveosoccus*.

Альбендазол относится к группе бензимидазолов. Тормозит белковый (тубулярный) синтез, в результате чего нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ, обмен субстратов веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), из-за торможения фумаратредуктазы снижаются митохондриальные реакции, что вызывает гибель паразитов.

Триклабендазол взаимодействует с рецепторами тубулозола, что приводит к нарушению действия тубулина, но не вызывает тератогенного воздействия на животных. Подавляет синтез протеина в фасциолах и может разрушать окислительное фосфорилирование, что приводит к гибели фасциол всех форм развития в течение нескольких часов после введения препарата.

Показания

Лечение и профилактика **крупного рогатого скота, овец, коз** при фасцилезе и ассоциативных гельминтозах.

Противопоказания

Не назначать самкам в первую треть беременности, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары.



Способ применения и дозы

Перед использованием эмульсию хорошо взболтать.

Препарат применяют однократно с водой в таких дозах на 10 кг массы тела:

- **крупный рогатый скот** — 1 мл;
- **овцы, козы** — 0,75 мл.

Лечебно-профилактическую дегельминтизацию скота, который пасется на пастбищах, проводят в начале стойлового периода.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 14 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 2 суток.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50 мл (по 1 шт. в картонной коробке), 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +25 °С.

Срок годности

2 года.