

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А.РАБОЧИЙ
23.05.2017



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мастист Форте для лечения
млостита у коров в период лактации

(организация-разработчик: компания «Интервель Интернашнл Б.В.», Вим Де
Корверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастист Форте (Mastijet® Forte).

Международные непатентованные наименования: тетрациклини, исомицин, бандигранцин, преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интравибретиального введения.

Мастист Форте в 1 шприце-дозаторе в качестве действующих веществ содержит: 200 мг тетрациклина (в форме гидрохлорида), 250 мг исомицина (в форме сульфата), 2000 МН бандигранцина и 10 мг преднизолона, в качестве вспомогательных веществ — стеаратмагния и вазелиновое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую суспензию желто-коричневого цвета.

Срок годности Мастист Форте при соблюдении условий хранения и транспортирования 24 месяца со дня производства.

Мастист Форте запрещается применять по истечении срока годности.

4. Мастист Форте выпускают расфасованным по 8 г в пластиковые шприцы-дозаторы одноразового применения, наконечники которых снабжены защитными колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с очищающими салфетками и инструкцией по применению.

5. Мастист Форте хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 8°C.

6. Мастист Форте хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Мастист Форте отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мастнет Форте относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам.

10. Комбинация антибиотиков, входящих в состав Мастнет Форте, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, наиболее часто выделяемых при мастите коров, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Klebsiella spp.*, *Aeromonas* *sp.*, *Escherichia coli*.

Механизм действия входящих в состав препарата тетрациклина и неомицина заключается в ингибировании синтеза белков в бактериальной клетке.

Бациллазин, проникая в бактериальную клетку, связывается с рецепторами на ее внутренней поверхности и нарушает синтез цитогликозана — основного компонента клеточной стени.

Преднизолон — глюкокортикоид, обладая противовоспалительным и противоспазмогенным действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени. При введении лекарственного препарата в молочные цистерны действующие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов.

Мастнет Форте по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не оказывает раздражающего действия на ткани вымени.

III. Порядок применения

11. Мастнет Форте предназначен для лечения клинической и субклинической форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не рекомендуется применять Мастнет Форте коровам в период сухостоя, а также использовать очищающие салфетки для обработки сосков вымени с открытыми ранами.

13. Мастнет Форте вводят в выраженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) 3-4-кратно с интервалом 12 часов.

Перед применением лекарственного препарата четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют кончик соска прилагаемой очищающей салфеткой. Затем удаляют верхушку защитного колпачка с наконечника шприца-дозатора, вводят наконечник в молочный канал (на 5 мм) или удаляют колпачок полностью и вводят наконечник в сосковый канал на всю его длину. Предпочтительным способом является частичное введение, при невозможности его выполнения наконечник шприца-дозатора вводят на всю его длину, при этом эффективность лечения не снижается. Содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в четверть вымени; извлекают шприц-дозатор, пережимают верхушку соска и массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

14. Симптомы передозировки при применении Мастнет Форте не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлены.

16. Отсутствуют противопоказания к применению в период беременности и лактация. Не рекомендуется применять лекарственный препарат за 2 месяца до отела.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата пополняют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении Мастист Форте в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение Мастист Форте прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Мастист Форте не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацервикального введения.

20. В пищевых целях молоко может быть использовано не ранее, чем через 96 часов после последнего введения Мастист Форте. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное ранее установленного срока, можно использовать после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Мастист Форте. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Мастист Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастист Форте. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу; после работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустых инпринс-дозаторов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands/ «Интервэт Интернейшнл Б.В.», Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксмэр, Нидерланды.

ООО «Интервэт» (Россия, 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Мастист Форте, утвержденная Россельхознадзором 13.12.2011 г.

Номер регистрационного удостоверения

528-3-36.1d - 038A/788-3-02/02/02