

НИФУЛИН

Описание

Порошок желтого цвета

Состав

1 г препарата содержит действующие вещества:
метронидазол - 10 мг;
окситетрациклина гидрохлорид - 22,5 мг;
неомицина сульфат - 30 мг;

Фармакологические свойства

Нифулин - комплексный препарат, действующий против грамположительных и грамотрицательных бактерий. Метронидазол обладает широким спектром действия на многих простейших в том числе трихомонад, лямблий, балантидий, амёб, гистомонад. Окситетрациклин обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а именно: *Clostridium* spp., *Actinomyces pyogenes*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *E.coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Klebsiella* spp., *Campylobacter* spp., *Bacillus* spp., *Brucella* spp., *Moraxella* spp., *Salmonella* spp. Он также активен против микоплазм (*Mycoplasma* spp.), Риккетсий (*Rickettsia* spp.), хламидий (*Chlamydia*) и некоторых простейших. Неомицин - аминогликозидный антибиотик, который действует бактерицидно, главным образом на аэробные бактерии. К его действию чувствительны следующие грамотрицательные (*E. coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp.) и некоторые грамположительные микроорганизмы (*Staphylococcus* spp.).

Применение

Лечение телят в возрасте от 4 до 8 недель. Ягнят, козлят в возрасте до 4 месяцев, домашней птицы, свиней при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочевыводящих путей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к метронидазолу, окситетрациклину и неомицину.

Дозировка

Перорально в дозе: телята, козлята, ягнята - 1-2 г препарата на 25 кг массы тела в течение 5-7 суток; поросята - 100 мг на кг массы тела или 5 кг препарата на 1000 кг корма в течение 5-7 суток; цыплята - 1 кг препарата на 1000 кг корма в течение 5-7 суток.

Побочные действия

При правильном использовании и дозировке побочные явления не наблюдаются.

Противопоказания

Не применять жвачным животным с функционально развитыми преджелудками. Не применять курам несушкам, яйца которых используют в пищу людям.

Особые указания

Перед применением препарат тщательно смешивают с кормом. Убой животных и птицы на мясо разрешается через 6 суток после последнего применения препарата. Полученное до указанного срока мясо утилизируют.

Форма выпуска

Полиэтиленовые пакеты по 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1000 г.

Хранение

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 °С до 20 °С.

Срок годности - 2 года.