



Первый шаг при
лечении наружного
отита у собак



ОТИБИОВИН ушные капли

Раствор

СОСТАВ

1 мл препарата содержит:
триамцинолона ацетонид –
0,5 мг, салициловая кислота –
5 мг, сульфат гентамицина – 2 мг,
бромида карбетопендицин –
0,125 мг.
Капли для ушей, раствор.
Бесцветный, немного мутный
раствор.

ЦЕЛЕВОЙ ВИД ЖИВОТНЫХ

Собаки, кошки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Наружный отит, вызванный
микроорганизмами,
чувствительными к активным
веществам препарата.

ДОЗИРОВКА

Закапывайте 4–5 капель
препарата в ушной канал
3–4 раза в день в начале
лечения, через 3 дня: 2–3 раза
в день. Затем рекомендуется
слегка помассировать вокруг
уха для лучшего впитывания
препарата в ткани. В случае
покрытия корочкой сначала
рекомендуется высушить ткань
и пинцетом удалить корочку.
Как правило, лечение
проводится в течение 5–7 дней,
максимум в течение 12 дней
(3 дня после исчезновения
симптомов).

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца, после открытия
упаковки – 12 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре ниже
25 °C. Беречь от воздействия
света.

УПАКОВКА

15 мл.