

Офлоксацинвет 10% (раствор для инъекций)

ингредиенты: ОФЛОКСАЦИН

применение: ИНЪЕКЦИОННОЕ

тип препарата: АНТИБИОТИК

ОПИСАНИЕ

Прозрачная, маслянистая жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

офлоксацин — 100,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Действующим веществом препарата является антибиотик офлоксацин, антибиотик, группы фторхинолонов, Офлоксацин активен по отношению к грамотрицательным и грамположительным микроорганизмам, а особенно против: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Serratia* spp., *Campylobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia* spp., *Vibrio* spp., *Aeromonas* spp., *Haemophilus* spp., к препарату также чувствительны: *Brucella* spp., *Chlamydia trachomatis*, *Staphylococcus* spp., (включая пеницилиназо-продуцирующие и метицилин-стойкие штаммы) *Mycoplasma* spp. и *Mycobacterium* spp. Механизм действия препарата состоит в ингибировании бактериальной ДНК-гиразы (топоизомеразы II), таким образом, останавливает процесс спирализации и синтеза ДНК.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение у собак и кошек при септицемии, артрите, полиартрите, менингите, мастите, дерматите, вторичной инфекции при вирусных заболеваниях, а также при заболеваниях органов дыхания (тонзиллит, трахеит, пневмония, бронхит, ринит, синусит, бронхопневмонии), пищеварительного канала (гастрит, энтерит, перитонит), мочеполовой системы (нефрит, пиелит, пиелонефрит, уретрит, уроцистит), которые вызваны чувствительными к офлоксацину микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА

Внутримышечно в дозе 0,25 мл препарата на 10 кг массы тела. Применяют препарат с интервалом 24 часа, курс лечения 3-5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к офлоксацину.

Не применять животным с нарушением функции почек и печени.

Не применять одновременно с тетрациклинами, макролидами, линкозамидами, хлорамфениколами, а также с нестероидными противовоспалительными средствами.

Не применять для лечения коней.

Не применять собакам мелких пород до 8 - месячного возраста, собакам крупных пород до 18 - месячного возраста, котам до 8-месячного возраста в связи с негативным действием на образование костной ткани.

Не лечить животных с признаками заболеваний центральной нервной системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Препарат не рекомендован животным в период беременности. Применение препарата допускается только в том случае, когда эффект от применения превышает возможные негативные последствия.

В месте введения препарата возможен отек и болевая реакция. При возникновении этих симптомов применения прекращают и назначают десенсибилизирующую терапию.

Если после введения препарата есть отек и болевая реакция рекомендуется использовать препарат оральным путем в тех самых дозах, как и при внутримышечном введении, потому что биодоступность офлоксацина достигает 100%.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы из нейтрального стекла марки НС-1. НС-2, УСП-1, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10, 20, 50 и 100 мл. Вторичная упаковка – картонная упаковка.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 до 25°C.

Срок годности — 2 года.