

Простая защита от трудноизлечимой инфекции дыхательных путей



6 Вакцины для кроликов



ПАЗОРИН-ОЛЬ ин. для вет. прим.

Вакцина против пастереллёза кроликов

СОСТАВ

Суспензия:
Суспензия бактерии *Pasteurella multocida A, D* мин. $1 \cdot 10^{10}$
Адьювант: масляная эмульсия до 1,0 мл

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Вакцина служит для иммунопрофилактики пастереллёза кроликов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ЛАКТАЦИИ

В течение 14 дней после вакцинации и в течение 14 дней после повторной вакцинации у самок кроликов может наблюдаться снижение показателя беременности (до 15%). Иные виды негативного воздействия на ход беременности и лактации не наблюдались. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия
Вакцина может применяться одновременно с вакциной Песторин Мормикс сухой лифоллизированной для разведения перед употреблением для вет. применения.

ДОЗИРОВКА

Кролики в возрасте 4 – 6 недель 0,5 мл
Кролики в возрасте старше 7 недель 1 мл.
Рекомендуемая схема вакцинации:

- 1-я доза вакцины в возрасте 4 недели;
- 2-я доза вакцины в возрасте 7 недель;
- 3-я доза вакцины в возрасте 10 недель (племенные кролики).

В дальнейшем осуществляется регулярная вакцинация с использованием одной дозы вакцины с интервалом в 6 месяцев.

При первой вакцинации кроликов старшего возраста иммунизацию следует производить дважды с интервалом в 3 недели, дальнейшая регулярная вакцинация осуществляется с использованием одной дозы вакцины с интервалом в 6 месяцев.

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ

Подкожно.

СРОК ГОДНОСТИ

1 год, использовать в течение 10 часов после первого открытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °С – 8 °С. Не замораживать.

УПАКОВКА

1 × 20 мл, 1 × 100 мл.