



Безопасная
инактивированная
вакцина для легкого
подкожного
введения против
геморрагической
болезни кроликов



ПЕСТОРИН ин. для вет. прим.

Вакцина против геморрагической болезни кроликов

СОСТАВ

Действующее вещество в одной дозе:

Калицивирус, вызывающий геморрагическую болезнь кроликов (*Calicivirus septicaemiae haemorrhagiae cuniculi*) – мин. 128 ГА

Адьювант: водный гидроксид алюминия для абсорбции

ИНЪЕКЦИЯ

Для кроликов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для профилактической вакцинации здоровых кроликов против вирусной геморрагической болезни кроликов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ЛАКТАЦИИ

Может применяться при беременности.

Не рекомендуется применять для вакцинации самок кролика на последней неделе беременности в связи с риском выкидыша вследствие сильных схваток.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Возможно комбинирование вакцин – одновременно с подкожным введением вакцины от RHD (геморрагической болезни кроликов), возможно применение вакцины против миксоматоза (живой МХТ – согласно прилагаемому листку-вкладышу на вакцину от миксоматоза производства акционерного общества Bioveta с местонахождением в Ивановицах на Гане). Вакцины нельзя смешивать по причине различия их характеристик.

КОЛИЧЕСТВО И ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ

1 мл подкожно независимо от веса животного.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года, использовать в течение 10 часов после первого открытия контейнера.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °С – 8 °С. Не допускать заморозания вакцины!

УПАКОВКА

2 × 1 доза, 5 × 1 доза, 10 × 1 доза, 1 × 10 доз, 1 × 20 доз, 5 × 20 доз, 1 × 50 доз.