

ПОЛИМУН ИБК МУЛЬТИ

Флаконы
по 500, 1000, 2000, 5000 доз



POLIMUN IB MULTI

*против инфекционного бронхита кур,
живая*

Состав

Одна доза вакцины содержит полученные на СПФ куриных эмбрионах:
вирус инфекционного бронхита кур штамм Н-120 $\geq 3,5 \text{ lg ЭИД}_{50}$;
вирус инфекционного бронхита кур вариантный штамм БК-07 $\geq 3,5 \text{ lg ЭИД}_{50}$.

Форма выпуска

Лиофилизат.

Иммунобиологические свойства

Вакцинный вирус за 7-10 суток стимулирует формирование специфического иммунитета и защищает вакцинированных цыплят от заболевания в течение 6-7-ми недель.

Целевые животные

Куры.

Особые указания (в период яйценоскости)

Способ применения	Приготовление
Методом крупнокапельного спрея: в помещении снижают освещение до минимума. Вакцину разбрызгивают над определенным количеством цыплят с расстояния 30-40 см	1000 доз вакцины растворяют в 150-500 мл прохладной (10-20° С) питьевой воды
Интраназальным/интраокулярным методом: закапывают стандартной пипеткой на слизистую оболочку носа или конъюнктиву глаза по 1 капле	1000 доз вакцины растворяют в 30-50 мл физиологического раствора
Методом выпаивания: вакцинацию желательно проводить с утра. Для более качественного проведения вакцинации рекомендуется на 1 литр воды добавлять 2 г сухого обезжиренного молока или использовать средство «ИНДИГО МАКС» или другие аналогичные по качеству	Вакцину растворяют так, чтобы в предварительно определенном объеме воды для выпаивания содержалось по одной дозе вакцины для каждой птицы

Вода для выпаивания не должна содержать ионы хлора и железа, а также антибиотики и дезинфектанты. Поилки перед вакцинацией должны быть тщательно вымыты без добавления дезинфицирующих растворов.

Период выведения (каренции)

Нулевой.

Срок годности

18 месяцев.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С или минус 20° С.

www.biotestlab.ua