

Рафензол

эмульсия для перорального применения



ВОДО-РАСТВОРИМЫЙ



Состав

1 мл препарата содержит:
рафоксанид — 110 мг
фенбендазол — 75 мг

Описание

Жидкость белого цвета, без запаха и вкуса.

Фармакологические свойства

Антигельминтный препарат широкого спектра действия. Рафоксанид нарушает энергетический обмен гельминтов и способность разьединять окислительное фосфорилирование. Фенбендазол подавляет ферментную систему гельминтов, что приводит к нарушению энергетического обмена и вызывает гибель паразитов.

Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз** при трематодозах и нематодозах ЖКТ и легких, вызванных зрелыми трематодами семейства Paramphistomatidae и их личинками старше 6 недель, половозрелыми трематодами *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium lanceatum*, нематодами *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Dictyocaulidae* spp., *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Ostertagia* spp., *Strongyloides* spp., *Trichostrongylus* spp., *Trichuris* spp. и пр., цестодами *Avitellina centripunctata*, *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Thysaniezia giardi*, личинками *Oestrus ovis*.

Противопоказания

Не назначать только что отелившимся коровам и в последний месяц стельности, животным с клиническими расстройствами органов пищеварения (атония преджелудков, тимпания). Не применять одновременно с бромсаланфлукицидами.



Способ применения и дозы

При групповом методе каждую партию препарата предварительно проверяют на небольшом количестве животных. При отсутствии осложнений обработку проводят всему поголовью. Перед применением препарат смешивают с водой температурой +25–30 °С или с 1,5–2 кг увлажненного комбикорма. Лечение проводят до начала утреннего кормления, однократно. Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных и заболеваний	Доза, мл / 10 кг массы тела
Крупный рогатый скот:	
дикроцелиоз, фасциолез	0,75
парафистоматидоз	1
Овцы, козы:	
ассоциированные гельминтозы, эстроз	0,75

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 28 суток. Людям употреблять в пищу молоко можно через 7 суток.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50, 100 мл, 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °С.

Срок годности

3 года.