

Раствор кофеина бензоата 20%

раствор для инъекций



Состав

1 мл препарата содержит:
кофеин – 80 мг
натрия бензоат – 120 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Препарат возбуждает центральную нервную систему животных, активизирует кровообращение, мочеиспускание, стимулирует работу дыхательных органов, повышает работоспособность скелетных мышц.

Показания

Лечение **лошадей, крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, собак, котов** при общем угнетении, ослаблении сердечной деятельности, переутомлении, замедлении обмена веществ, тяжелых родах, родильном парезе, спазмах кишечника, интоксикации препаратами для наркоза и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной возбудимостью, пороками сердечно-сосудистой системы.

Способ применения и дозы

Препарат применяют подкожно в следующих дозах на 1 животное:

- лошади, крупный рогатый скот** – 10-25 мл;
- свиньи, овцы, козы** – 2-7 мл;
- собаки** – 0,5-1,5 мл;
- коты** – 0,2-0,5 мл.

При пероральном применении указанные дозы увеличивают в 2 раза. При необходимости допускается введение препарата 2-3 раза с интервалом 7 часов.

Предостережения

Не вводить внутримышечно!

Использование в максимальных терапевтических дозах иногда усиливает сердечную деятельность, пугливость и рефлекторную возбудимость.

При одновременном применении с α- и β-адреномиметиками повышается риск гиперстимуляции, с анальгетиками и антиприретиками – повышается их биодоступность, с анксиолитиками – снижается их эффект, с изониазидом, циметидином – усиливается действие кофеина, с ингибиторами МАО – повышается артериальное давление, с производными ксантина и психостимулирующими веществами – риск гиперстимуляции, со снотворными и седативными средствами – снижается седативный эффект, с тиреотропными средствами – усиливается их действие, с эрготамином – улучшается всасывание последнего в ЖКТ.

Упаковка

Стеклянные и полимерные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +3 до +25 °C. Не допускать замораживания препарата. После вскрытия флакона препарат хранить в холодильнике и использовать в течение 48 часов.

Срок годности

3 года.