

**Санодерм**  
**(крем)**  
листовка-вкладка

**Описание**

Крем белого или почти белого цвета.

**Состав**

1 г препарата содержит действующие вещества (мг):

бетаметазона дипропионата  
(в пересчете на 100 % вещество) 0,64;

гентамицина сульфата  
(в пересчете на безводный гентамицин) 1;

клотримазола  
(в пересчете на 100 % вещество) 10.

Вспомогательные вещества: метилпарабен (метилпарагидроксибензоата) (Е 218) - 2 мг, пропиленгликоль, динатрия едетат, масло минеральное, парафин белый мягкий, спирт цетостеариловый, макрогола 20 цетостеариловый эфир, натрия дигидрофосфат моногидрат, натрия гидрофосфат додекагидрат, вода очищена.

**Фармакологические свойства**

Благодаря комбинации действующих веществ, препарат имеет противовоспалительное, противоаллергическое, антибактериальное, противогрибковое действие.

*Бетаметазона дипропионат* - синтетический фторсодержащий кортикостероид. Имеет противовоспалительное, глюкокортикоидное, противоаллергическое, противозудное действия. При местном использовании суживает сосуды, устраняет зуд, замедляет выделение медиаторов воспаления (изоэозинофилов, гладких клеток), интерлейкинов 1 и 2,  $\gamma$ -интерферона (из лимфоцитов и макрофагов), тормозит активность гиалуронидазы и снижает проницаемость стенок сосудов. Метаболизируется в печени. Выводится почками, частично выделяется с молоком.

*Клотримазол* - принадлежит к группе имидазольных противогрибковых лекарственных средств. Способствует увеличению проницаемости фосфолипидной оболочки липосом, вакуолизации цитоплазмы, снижения количества рибосом. Активный по отношению к: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur* (*Pityrosporum orbiculare*).

*Гентамицин* - антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, действует бактерицидно по отношению к грамотрицательным бактериям: *Pseudomonas aeruginosa*, *Aerobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*; грамположительных бактерий: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*.

При наружном применении препарата Санодерм в терапевтических дозах, трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь, очень маловероятное. Применение окклюзионных повязок значительно повышает трансдермальное всасывание бетаметазона и гентамицина, что может привести к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

**Применение**

Для лечения собак и кошек при дерматозах с выраженной аллергической, воспалительной реакцией, зудом, гиперемией, отеком, инфильтрацией экссудата, усложненных вторичной бактериальной инфекцией; грибковых заболеваниях кожи : дерматофитии, вызванной *Microsporum canis*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, кандидозах, вызванных *Candida albicans*, *Candida parapsilosis*, поражении дрожжевыми грибами *Malassezia furfur*.

**Дозирование**

Крем применяют внешне местно. Доза препарата зависит от площади пораженного участка. Перед нанесением крема шерсть на пораженном участке выстригают. Крем необходимо наносить на пораженную кожу и окружающие участки тонким слоем 2 раза на сутки (утром и вечером), осторожно втирая в кожу; после достижения клинического улучшения частота применения препарата может быть уменьшена до 1 раза на сутки.

Длительность лечения определяется ликвидацией воспалительного процесса и негативными данными бактериального и/или микологического анализа, прекращением зуда, очисткой кожи.

Курс лечения зависит от вида и тяжести течения заболевания, эффективности терапии, определяется врачом ветеринарной медицины и обычно представляет 2-4 недели (не больше); между повторными курсами необходимый перерыв не менее 20 суток.

**Противопоказание**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Побочное действие**

Чрезмерное и длительное применение препарата на большой поверхности кожи может привести к проявлению системных эффектов, свойственных для применения глюкокортикостероидов, а именно: притеснение гипоталамо-гипофизарно-надпочечной системы с развитием вторичной недостаточности надпочечников, проявления симптомов гиперкортицизма (увеличение массы тела, отеки, гипертензия, глюкозурия, гипокалиемия), возникновения синдрома Иценко-Кушинга.

**Предостережение**

Избегать попадания препарата в глаза, открытые раны.

Не наносить крем на кожу вокруг глаз.

**Форма выпуска**

Туба по 15 г. 1 туба в пачке.

**Хранение**

В оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Срок годности препарата - 3 года.

**Для применения в ветеринарной медицине!**

**Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта**

ПАО "Киевмедпрепарат"

01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.