

Сексанет

суспензия для перорального применения,
капли



Состав

1 мл препарата содержит:
мегестрола ацетат — 40 мг

Описание

Жидкость желтоватого цвета, однородная.

Фармакологические свойства

Мегестрола ацетат — синтетический прогестаген, блокирует секрецию фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гонадотропных гормонов, которые продуцирует передняя доля гипофиза. Недостаток этих гормонов сдерживает созревание фолликулов в яичниках самок и овуляцию, прекращает течку, снижает половое влечение. Влияет на эндометрий матки и вызывает ее секреторную фазу, что тормозит имплантацию зародыша и обеспечивает контрацептивное действие. У самцов блокирует синтез тестостерона, что снижает половую активность и связанные с ней беспокойство, возбуждение и агрессивное поведение.

Быстро абсорбируется в кишечнике и через 3 часа после применения достигает максимальной концентрации в крови. Метаболизируется в печени и выводится из организма в течение 1–2 суток в виде метаболитов с мочой.

Показания

Используют для предупреждения либо прекращения течки и/или предупреждения нежелательной беременности у **кошек и сук**. Для угнетения полового влечения, корректировки нежелательного поведения (повышенная возбудимость, агрессивность, склонность к блужданию и пр.) у **котов и кобелей**. Для предупреждения течки и/или синхронизации половой охоты у **самок свиней**.

Противопоказания

Не использовать при заболеваниях половой системы (пиометра, метрит, эндометрит и пр.), опухолях молочной железы, диабете, неполовозрелым, беременным и кормящим животным. Не применять препарат, если после наступления течки прошло более 3-х суток, а также молодым животным в первую течку из-за сложности определения начала цикла.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с кормом или принудительно на корень языка.

Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.



Вид животного и цель применения	Доза, капли / мл	Применение
Самки свиней:		
синхронизация полового влечения свиноматок	4 / 0,125 *	14 дней
синхронизация полового влечения ремонтных самок	8 / 0,25 *	после отмены препарата фаза полового возбуждения у свиноматок наступает через 42–43 суток
предупреждение полового возбуждения самок на откорме	8 / 0,25 *	10–14 дней, начинать через 2 недели после предыдущего полового возбуждения
Кошки:		
предупреждение течки	4 / 0,125	1 раз в 2 недели (не более 18 мес.)
	2 / 0,0625	1 раз в неделю (не более 18 мес.)
прекращение течки	4 / 0,125	ежедневно, 3–5 дней до исчезновения признаков течки, начинать не позднее чем на 3-й день с момента появления полового возбуждения
контрацепция	4 / 0,125	в 1-й день после спаривания
Суки:		
предупреждение течки	4 / 0,125 *	ежедневно, начинать за 7–10 дней до начала течки, не дольше 4 недель
прекращение течки	8 / 0,25 *	первые 3 дня с момента появления полового возбуждения
	4 / 0,125	следующие 7 дней
контрацепция	8 / 0,25 *	первые 2 дня после спаривания
Коты:		
успокаивание при половом возбуждении	4 / 0,125	5–7 дней, повторять 1 раз в неделю
Кобели:		
успокаивание при половом возбуждении	8 / 0,25 *	первые 5 дней с момента появления полового возбуждения
	4 / 0,125 *	следующие 7 дней до полного успокоения

* на 10 кг массы тела

Предостережения

При длительном использовании препарата возможно изменение характера животного, увеличение молочных желез, повышение аппетита и увеличение массы тела. После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 14 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 5, 10, 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +25 °С.

После вскрытия флакона препарат хранить плотно закрытым в холодильнике и использовать в течение месяца.

Срок годности

2 года.