

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



14.11.2011  
14-11-2011

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
**Скалибор® инсектоакарицидный ошейник**

(Организация-разработчик: компания «Интервэт Интернашнл Б.В.», Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 AA Бокхолт, Нидерланды/ Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands).

Номер регистрационного удостоверения:

С22-3-0015-2071 № РВН-3-50/03.045

#### 1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Скалибор® инсектоакарицидный ошейник (Scalibor® insecticarciidal collar).

Международное непатентованное наименование: дельтаметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Скалибор® инсектоакарицидный ошейник содержит (в процентном соотношении) в качестве действующего вещества дельтаметрин – 4%, а также вспомогательные вещества: сольватирующий пластификатор – динизоктилалгинат, носитель активного вещества – трифенилfosфат, стабилизаторы (кальций-цианкоохидратные мыла, оксицидированное соевое масло), красители: диоксид титана (E171), или железа оксида желтый (E172), или железа оксида красный (E172), или железа оксида черный (E172), поливинилхлорид (полимерная основа).

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой полимерную ленту в виде ошейника.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года с даты производства; после вскрытия упаковки ошейник необходимо сразу использовать.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Скалибор® инсектоакарицидный ошейник выпускают длиной 48 см или 63 см. По 1 ошейнику упаковывают в индивидуальный герметично закрытый многослойный пакет и помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

3. Скалиб<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя при температуре от 2 до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с законодательством.

8. Скалиб<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник отпускают без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Скалиб<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник относится к инсектоакарицидным средствам из группы синтетических пиретроидов.

10. Дельтаметрин - (S)-циано-(3-феноксифенил) метил(1R, 3R)-3-(2,2-дигроманил)-2,2-диметициклоопропанкарбоксилат, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, не всасываясь в системный кровоток переносится на кожно-волосистой покров животного и оказывает длительное инсектоакарицидное (контактное и кишечное), а также репеллентное действие на насекомых (блох, вшей, клещей, комаров, москитов) и наседовых клещей, паразитирующих на собаках.

Механизм действия дельтаметрина заключается в необратимой активации натриевых каналов мембранных нервных клеток, деполяризации клеточных мембран и блокаде нервной проводимости, что приводит к нарушению двигательных рефлексов, и в конечном итоге вызывает полный паралич и гибель членистоногих.

Скалиб<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

## III. Порядок применения

11. Скалиб<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник предназначен для защиты собак от эктопаразитов. Препарат применяют собакам для уничтожения блох, вшей, клещей, комаров, москитов и наседовых клещей, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности эктопаразитов).

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе пиретроидов в анамнезе). Не подлежат обработке животные больные инфекционными болезнями, со значительными повреждениями кожи, а также щенки моложе 7-недельного возраста.

13. Ошейник влагостоек, его эффективность не снижается при намокании, но, учитывая высокую токсичность дельтаметрина для рыб и

других гадробионтов, перед купанием собаки в природном водоеме ошейник необходимо снять.

При работе со Скалибор<sup>®</sup> инсектоакарицидным ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Скалибор<sup>®</sup> инсектоакарицидным ошейником.

Владельцу животного при наличии на руках перчаток и сидя при манипуляциях с ошейником следует пользоваться резиновыми перчатками. После закрепления ошейника на животном следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

В период применения ошейника следует избегать контакта животного с детьми младше 2-летнего возраста, а также не разрешать детям играть с ошейником.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством чистой воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Побочных эффектов при использовании препарата в соответствии с настоящей инструкцией у щенков и лактирующих сук и у щенков до отъема, не наблюдалось.

15. Скалибор<sup>®</sup> инсектоакарицидный ошейник применяют собакам с 7-недельного возраста: мелким и средним породам – ошейник длиной 48 см, крупным породам – ошейник длиной 65 см.

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток 1-2 см, фиксируют пражкой, и излишек ленты срезают, оставляя конец длиной около 5 см.

Непрерывное ношение Скалибор<sup>®</sup> инсектоакарицидного ошейника обеспечивает защиту животного от насекомых клещей и комаров в течение 6 месяцев, от москитов – в течение 5-6 месяцев, от блох, вшей и власоедов – в течение 4 месяцев. Максимальный защитный эффект достигается через неделю после начала использования ошейника.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к дельтаметрину у некоторых собак возможно появление туда и признаков раздражения кожи в области шеи, в этом случае использование Скалибор<sup>®</sup> инсектоакарицидного ошейника прекращают, а при необходимости назначают животному десенсибилизирующую терапию.

17. При случайном проглатывании препарата собакой (разрызание ошейника) могут появиться симптомы отравления (нарушение координации

движений, дрожь, избыточное сплюснутение, рвота), которые обычно проходят самостоятельно в течение 48 часов. При необходимости следует обратиться к ветеринарному врачу.

18. Запрещается одновременное применение Скалибор® инсектоакарицидного ошейника с фосфорорганическими инсектоакарицидными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении не выявлено.

20. Следует избегать нарушений сроков применения лекарственного препарата, поскольку это может привести к снижению эффективности обработки.

21. Скалибор® инсектоакарицидный ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес «Интервэт Продукшн С.А.» производственной площадки (Рю Де Лион 27460, Иговиль, производителя лекарственного Франция)/ Intervet Productions S.A. препарата для ветеринарного (Rue De Lyons 27460, Igoville, France). применения.

Наименование, адрес организации, ООО «Интервэт» (Россия, 143345, уполномоченной держателем или Московская область, Наро-владельцем регистрационного Фоминский район, пос. Селигино, ул. удостоверения лекарственного Промышленная, дом 81/1). препарата на принятие протестов от потребителя.