

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ СВИНЕЙ (внутрішньом'язові ін'єкції)



ПОРΟΣЯТА

Для підвищення збереженості новонароджених поросят: **0,1 мл/кг 1 раз на добу**.



на добування – 2 рази на місяць

Відлученим порослятам для підвищення стійкості до впливу стрес-факторів і підвищення приросту маси тіла: **1 раз на добу**.



Для профілактики стресу: **0,1 мл/кг 1 раз на добу** за 1 день перед стрес-фактором, або:



Для підвищення приросту ваги на відгодівлі: **0,1 мл/кг 1 раз на добу**.



СВИНОМАТКИ

Для:

- стимуляції охоти
- підвищення заплідненості
- збільшення багатомісності
- росту та розвитку плода
- стимуляції та підвищення опоросу
- підтримки лактації: **0,05-0,1 мл/кг**



Порослим свиноматкам для підтримки росту та розвитку плода: **0,05-0,1 мл/кг**



Підлітчим свиноматкам для покращення опоросу, прискорення зведення посліду, стимуляції та підтримки лактації: **0,05-0,1 мл/кг**



КНУРИ

Кнурам виробників і ремонтним кнурам для покращення якості сперми та стимуляції продукції сперми: **0,05 мл/кг 1 раз на тиждень**, або:



Для відтворення в мінимальному дозі під час фізично напружених періодів: **0,05-0,1 мл/кг**



Виробник:



Генеральний дистрибутор:



СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ВРХ (ВНУТРІШНЬОМ'ЯЗОВІ ІН'ЄКЦІЇ)



ТЕЛЯТА

0,1-0,5 мл/кг 1 раз на добу

Для підвищення природної резистентності та імунітету, запобігання ранній смертності:



Для підвищення приростів ваги одноразово або:



КОРОВИ

0,025-0,05 мл/кг 1 раз на добу

Для стимуляції лакції:



Для підвищення запліднюваності:



Для запобігання післяпологовій патології:



Для підвищення маси плодів: 1-3 рази на місяць в першу половину тижня

Для профілактики порушень метаболізму та зменшення маси тіла: під час лакції 1-3 рази на місяць протягом всього періоду



КОРОВИ ТА ТЕЛЯТА

Для підвищення імунної відповіді на вакцинацію 0,05 мл/кг



При порушеннях годівлі, гіпокальціємії, бактеріальних інфекціях, парентеральному захворюванні 0,05-0,5 мл/кг



Для профілактики стресу 0,1 мл/кг



При вірусних захворюваннях 0,05-0,5 мл 1 раз на день протягом лікування і в останній 3-5 днів лікування захворювання

Виробник:



Генеральний дистрибутор:



