

СУИМУН КЧС ЛК-М



Флаконы
по 10, 20, 50, 100 доз



SUIMUN CSF LK-M

против классической чумы свиней, живая

Состав

Одна доза вакцины содержит аттенуированный вирус классической чумы свиней, штамм ЛК-М $\geq 3,0 \text{ Ig TKID}_{50}$.

Форма выпуска

Лиофилизат.

Иммунобиологические свойства

Поствакцинальная защита наступает на 4-6-й день после вакцинации и сохраняется не менее одного года.

Целевые животные

Свиньи.

Показания к применению

Для профилактической иммунизации клинически здоровых свиней против КЧС.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вакцинировать животных другими препаратами можно не раньше, чем через 14 суток после введения вакцины против классической чумы свиней.

Особые указания (в период супоросности)

При угрозе заболевания вакцинируют однократно независимо от срока супоросности.

Способ применения и дозы

Статус хозяйства	Возраст животного	Кратность вакцинации	Приготовление	Способ применения
Благополучные по классической чуме свиней	Взрослые свиньи и ремонтный молодняк с 3-х месячного возраста	1 раз в год	Растворяют стерильным физиологическим раствором из расчета 2,0 мл на одну дозу или «Растворителем живых вакцин» (стр. 63)	Внутримышечно в область шеи «за ухом» или внутренней поверхности бедра
	Свиноматки за 20-15 суток до осеменения	1 раз в год		
Существует угроза инфицирования	Поросят в 30-45-дневном возрасте	Повторно – через 3-4 недели. В дальнейшем – 1 раз в год		
	Супоросные свиноматки	Однократно независимо от срока		

В дальнейшем все поголовье свиней вакцинируют с интервалом в один год.

Период выведения (каренции)

Нулевой.

Срок годности

24 месяца. Использовать вакцину в течение 4-х часов с момента ее растворения.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

