

Флаконы  
по 10, 20, 50, 100 доз



## SUIMUN ERY

*против рожи свиней, живая*

### Состав

Одна доза вакцины содержит вакцинный штамм WR2B рожи свиней  $\geq 4,0 \times 10^{6,0}$  живых бактерий.

### Форма выпуска

Лиофилизат.

### Иммунобиологические свойства

Иммунитет у здоровых животных формируется через 8-10 дней после вакцинации и сохраняется 6-8 месяцев.

### Целевые животные

Свиньи.

### Показания к применению

Для профилактической иммунизации свиней против рожи.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Одновременное применение вакцины с антибиотиками или с сывороткой против рожи свиней препятствует образованию активного иммунитета. Вакцинировать животных после лечения антибиотиками можно после окончания их воздействия на организм, и через 21 день после применения лечебной сыворотки против рожи свиней. В случае необходимости дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации свиней или через 2 недели после нее.

### Особые указания (в период супоросности)

Супоросных свиноматок не рекомендуется вакцинировать за неделю до опороса.

### Способ применения и дозы

В качестве растворителя используют «Растворитель живых вакцин» (стр. 63) по 2,0 мл на одну дозу.

Ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев.

Вид животного	Возраст животного	Дозировка	Способ применения
Свиньи	Начиная с 2-х месячного возраста, при весе 15 кг и более	По 2,0 мл	Внутримышечно в шею «за ухом» или подкожно в складку голени

### Период выведения (каренции)

Нулевой. Забой животных на мясо не зависит от срока вакцинации.

### Срок годности

12 месяцев. После растворения использовать в течение 2-х часов.

### Условия хранения

В темном, недоступном для детей месте, при температуре от 2 до 8° С или до минус 20° С.