

2. АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА

Тилозин 20%

раствор для инъекций



Состав

1 мл препарата содержит:
тилозина тартрат – 200 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, однородная, вязкая.

Фармакологические свойства

Антибиотик группы макролидов, подавляет синтез белка. Быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в тканях примерно через час. Терапевтическая концентрация сохраняется в организме 20–24 часов. Из организма выводится преимущественно с мочой и желчью, в период лактации — с молоком.

Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак, котов, кроликов** при бронхопневмонии, пневмонии, артите, дизентерии, мастите, послеоперационных и послеродовых инфекциях, вторичных бактериальных инфекциях при вирусных заболеваниях, заболеваний органов дыхания и ЖКТ, которые вызваны грамположительными микроорганизмами *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium* spp., *Clostridium* spp., *Listeria* spp., *Erysipelothrix* spp., некоторыми штаммами грамотрицательных микроорганизмов — *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Brucella* spp., риккетсиями *Rickettsia* spp., спирохетами *Spirochetes*, микоплазмой *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis* и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к тилозину, нарушениями функции печени, при резистентности к тилозину или кросс-резистентности к другим антибиотикам группы макролидов. Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и линкомицином.

Способ применения и дозы

Перед применением раствор подогревают до температуры +25–30 °C и вводят внутримышечно 1 раз в сутки, курс лечения — 3–5 дней. Дозы препарата на 10 кг массы тела составляют:

- **крупный рогатый скот** — 0,2–0,5 мл;
- **овцы, козы** — 0,3–0,6 мл;
- **свиньи** — 0,5 мл;
- **собаки, коты** — 0,15–0,5 мл;
- **кролики** — 0,6–1,2 мл.

Инъекцию, объем которой больше приведенных ниже значений, делят на несколько частей и вводят в разные места:

- **взрослый крупный рогатый скот** — 20 мл;
- **телята, овцы, козы** — 10–15 мл;
- **свиньи, поросыта** — 5–10 мл.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 8 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 3 суток. Мясо и молоко, полученные раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача.

Упаковка

Стеклянные ампулы по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), стеклянные флаконы по 20, 50, 100 мл.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности

2 года.