

Трематозол

эмульсия для перорального применения



Состав

1 мл препарата содержит:
оксиклозанид — 95 мг
пирантела памоат — 200 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, однородная, без запаха и вкуса.

Фармакологические свойства

Антигельминтик широкого спектра действия. Оксиклозанид — синтетическое соединение из группы салициланилидов. Тормозит и останавливает процесс окислительного фосфорилирования в организме трематод, что изменяет энергетический метаболизм паразитов и вызывает их гибель. Пирантела памоат — синтетическое соединение из группы пиримидинов. Вызывает деполаризованную нервно-мышечную блокаду (паралич) паразитов, в результате они выводятся из кишечника перистальтикой. Эффективен преимущественно против личинок и зрелых нематод, паразитирующих в ЖКТ, — *Neoascaris vitulorum*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Trichostrongylus columbriformis*, *T. axei*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *Chabertia ovina* и пр.

Показания

Лечение и профилактика **крупного рогатого скота, овец, коз** при гельминтозах, которые вызваны трематодами и нематодами, чувствительными к действующим веществам препарата.

Противопоказания

Не назначать коровам в первый месяц после оплодотворения, овцематкам в период спаривания и в первый месяц после вывода баранов из отары, истощенным животным.



Способ применения и дозы

Лечебно-профилактическая дегельминтизация проводится в начале стойлового периода. Препарат дают однократно, с питьевой водой в следующих дозах на 10 кг массы тела:

- **крупный рогатый скот** — 1 мл;
- **овцы, козы** — 0,75 мл.

Предостережения

При групповой дегельминтизации тщательно проверять точность дозировки. После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 14 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через сутки.

Упаковка

Полимерные флаконы по 50 мл (по 1 шт. в картонной коробке), 1 л.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +25 °С.

Срок годности

3 года.