



- [ОПИСАНИЕ](#)
- [ОТЗЫВОВ \(0\)](#)

Рекомендация по применению

АПТЕЧКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ

для цыплят, утят, гусят, индюшат

В первые дни жизни домашней птице наиболее важно обеспечить защиту от инфекций и поддержать энергетический баланс организма. Для этого в первые дни жизни цыплят (утят, гусят или индюшат) необходимо на протяжении трех дней ежедневно выпаивать птиц раствором, содержащий антибиотик и аскорбиновую кислоту.

Обязательным условием успешного выращивания птицы является оптимальное соотношение витаминно-минерального баланса в организме. С этой целью используйте витаминный препарат ДЕКАВИТ. В дальнейшем для профилактики кокцидиоза и ускорения роста птицы рекомендуется применять препарат Ампролинвет 12,5%.

Все выше перечисленные препараты необходимо растворять в теплой питьевой воде.

Необходимо помнить, что применение ветеринарной аптечки дает хорошие результаты только в сочетании с правильным содержанием и кормлением домашней птицы.

1. ПАРАМИЦИН (пероральный раствор) - содержит два антибиотика энрофлоксацин - 120 мг/мл и колистин сульфат - 1200000 ЕД/мл.

В результате синергизма активных веществ, активность препарата значительно выше, чем его отдельно взятых компонентов.

Энрофлоксацин действует против грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.* и других) и грамотрицательных микроорганизмов (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.* и другие), а также действует на микоплазмы (*Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma hyosynoviae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma iowae*).

Напишите нам, мы онлайн!

Колистин – антибиотик группы полимиксина. Он действует на грамотрицательные бактерии (такие как E. coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.)

Способ применения: применять с первых дней жизни. Содержимое одной ампулы (0,75 мл) растворить в 1 литре теплой питьевой воды. Использовать раствор в день его приготовления. Содержимое ампулы рассчитано на 50 птенцов. В случае наличия меньшего поголовья птицы соответственно уменьшают количество раствора.

Применять в течение 3-х дней с профилактической целью. Следует отметить, что Парамидин хорошо сочетается с аскорбиновой кислотой, которую обычно назначают цыплятам в первые дни жизни. При этом рекомендуется сначала развести в воде витамин С (на кончике ножа), а затем добавить туда Парамидин из расчета 0,75 мл на 1 л питьевой воды.

2. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА - (витамин С) (порошок). Играет важную роль в жизни молодых птиц. Выпаивают согласно предложенной схеме.

ВНИМАНИЕ! Пакет содержит 2 г порошка. В воде одновременно растворять только 50 мг (на кончике ножа)!

На кончике ножа примерно 50 мг.

Способ применения: из расчета на 50 голов молодняка.

1-3 сутки жизни по 50 мг - на 1 л воды (на кончике ножа)

9 - 20 сутки жизни по 100 мг - на 2 л воды

21-25 сутки жизни по 200 мг - на 3,5 – 4 л воды.

Аскорбиновая кислота действует как стимулятор ферментов, что улучшает переваривание пищи, аппетит.

Повышает фагоцитоз, свертывание крови, усиливает иммунитет и устойчивость молодняка к инфекциям.

3. ДЕКАВИТ (пероральный раствор)- комбинированный поливитаминный препарат, содержит витамины А, D3, Е, К3, В1, В5, В6, В12, С, L-лизин, составленных в научно обоснованных пропорциях. Применяется для профилактики и лечения заболеваний, вызванных отсутствием или недостатком витаминов в организме, а также для активизации жизненно важных физиологических функций. Обеспечивает высокий темп роста, яйценоскость, сохранность молодняка и устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Способ применения: ДЕКАВИТ применяется с 4-х по 8-е сутки путем выпаивания из расчета 1 мл на 1 л воды. 1 л воды на 50 голов цыплят.

4. АМПРОЛИНВЕТ (порошок) - кокцидиостатик. Препарат в указанных дозах используют для профилактики и лечения кокцидиозов, вызванных возбудителями рода Eimeria.

Способ применения: препарат применяется с 21-х суток в течение 5-ти суток. Содержимое одного пакета растворить в 2 литрах питьевой воды. Раствор использовать в день приготовления. 1 пакет на 50 птенцов на 1 день.

ВНИМАНИЕ! При угрозе заражения кокцидиозом молодняка птиц по решению ветеринарного врача, Ампролинвет порошок может применяться вне рекомендованной схеме, а именно, с первых дней жизни на протяжении всего периода угрозы кокцидиоза.

В состав аптечки входят:

1. Парамицин (пероральный раствор)- 3 ампулы по 0,75 мл.
2. Аскорбиновая кислота (Витамин С) (порошок) -1 пакет -2 гр. (Важно учитывать правильность применения. См. п. 2)
3. ДЕКАВИТ (пероральный раствор) 5 ампул по 1 мл.
4. Ампролинвет (порошок) -5 пакетов по 2 гр.
5. Рекомендация по применению.

Рекомендуемая схема последовательности применения препаратов:

Возраст птенцов в днях	Парамицин пероральный (раствор)	Аскорбиновая кислота (порошок)	ДЕКАВИТ пероральный (раствор)	Ампролинвет (порошок)
с 1 по 3	+	+	-	-
с 4 по 8	-	-	+	-
с 9 по 20	-	-	-	-

Напишите нам, мы онлайн!

с 21 по 25	-	+	-	+
------------	---	---	---	---

Срок годности Аптечки: Внимание! В состав ветеринарной Аптечки входят препараты с различным сроком годности. Поэтому срок годности Аптечки ветеринарной указан по препарату, срок годности которого заканчивается раньше всех.

НЕТ ОТЗЫВОВ О ДАННОМ ТОВАРЕ.

НАПИСАТЬ ОТЗЫВ

Ваше имя:
Ваш отзыв:

ОТПРАВИТЬ

< > x

Украина, Харьков, Ул. Смольная, 30

info@vetsintez.com

+380-57-714-37-51

+380-57-714-37-52

+380-57-757-84-71

+380-57-757-84-74

- [О компании](#)
- [Публикации](#)
- [Новости](#)
- [Контрактное производство](#)
- [Контакты](#)