



[СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ](#)

- [ОПИСАНИЕ](#)
- [ОТЗЫВОВ \(0\)](#)

Рекомендация по применению

АПТЕЧКА ВЕТЕРИНАРНАЯ СУПЕР

для цыплят, утят, гусят, индюшат

В первые дни жизни домашней птицы наиболее важно обеспечить защиту от инфекций и поддержать энергетический баланс организма. Для этого в первые дни жизни цыплят (утят, гусят или индюшат) необходимо на протяжении трех дней ежедневно выпаивать птиц раствором, содержащим специально подобранные антибиотики и аскорбиновую кислоту.

Обязательным условием успешного выращивания молодых птиц является оптимальное соотношение витаминно-минерального баланса в организме. С этой целью используйте витаминный препарат ДЕКАВИТ. В дальнейшем для профилактики кокцидиоза птицы рекомендуется применять препарат Тримератинвет. Для ускорения роста и повышения иммунитета молодой птицы рекомендуется выпаивать ЦИАНОФОР.

Все выше перечисленные препараты необходимо растворять в теплой питьевой воде.

Необходимо помнить, что применение ветеринарной аптечки дает хорошие результаты только в сочетании с правильным содержанием и кормлением домашней птицы.

1. ПАРАТИЛ (пероральный раствор) - содержит три антибиотика: энрофлоксацин – 80 мг/мл; колистин сульфат – 600000 МЕ/мл; тилмикозин фосфат в пересчете на тилмикозин – 75 мг/мл. В результате синергизма активных веществ, активность препарата значительно выше, чем его отдельно взятых компонентов.

Энрофлоксацин действует против грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.* и других) и грамотрицательных микроорганизмов (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasterella spp.*, *Bordetella spp.* и другие), а также действует на микоплазмы

Напишите нам, мы онлайн!

(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma meleagridis, Mycoplasma iowae).

Колистин – антибиотик группы полимиксинов. Он действует на грамотрицательные бактерии (такие как E. coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp.)

Тилмикозин полусинтетический антибиотик группы макролидов с широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а особенно против Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinomyces spp. Corynebacterium spp и Mycoplasma spp..

Способ применения: применять с первых дней жизни. Содержимое одной ампулы (1 мл) растворить в 1 литре теплой питьевой воды. Использовать раствор в день его приготовления. Содержимое ампулы рассчитано на 50 птенцов. В случае наличия меньшего поголовья птицы соответственно уменьшают количество раствора. Применять в течение 3-х дней с профилактической целью. Следует отметить, что Паратил хорошо сочетается с аскорбиновой кислотой, которую обычно назначают цыплятам в первые дни жизни. При этом рекомендуется сначала развести в воде витамин С (на кончике ножа), затем добавить туда Паратил и Цианофор - (см. п. 5).

2. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА - (витамин С) (порошок). Играет важную роль в жизни молодых птиц. Выпаивают согласно предложенной схеме.

ВНИМАНИЕ! Пакет содержит 2 г порошка. В воде одновременно растворять 50 мг (на кончике ножа)!

На кончике ножа примерно 50 мг.

Выпаивают согласно предложенной схеме.

Способ применения: из расчета на 50 голов молодняка.

1-3 сутки жизни по 50 мг - на 1 л воды (на кончике ножа)

9 - 20 сутки жизни по 100 мг - на 2 л воды.

21-25 сутки жизни по 200 мг - на 3,5 – 4 л воды.

Аскорбиновая кислота действует как стимулятор ферментов, что улучшает переваривание пищи, аппетит.

Повышает фагоцитоз, свертывание крови, усиливает иммунитет и устойчивость молодняка к инфекциям.

На кончике ножа примерно 50 мг.

Напишите нам, мы онлайн!

3. ДЕКАВИТ (пероральный раствор) - комбинированный поливитаминный препарат, содержит витамины А, D3, Е, К3, В1, В5, В6, В12, С, L-лизин, составленных в научно обоснованных пропорциях. Применяется для профилактики и лечения заболеваний, вызванных отсутствием или недостатком витаминов в организме, а также для активизации жизненно важных физиологических функций. Обеспечивает высокий темп роста, яйценоскость, сохранность молодняка и устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Способ применения: ДЕКАВИТ применяется с 4-х по 8-е сутки путем выпаивания из расчета 1 мл на 1 л воды. 1 л воды на 50 голов цыплят.

4. ТРИМЕРАТИНВЕТ (порошок) - комбинированный препарат, в состав которого входят сульфадимезин и триметоприм. Кроме противомикробного действия препарат имеет антикокцидные свойства. Препарат используют для профилактики кокцидиозов, вызванных возбудителями рода *Eimeria* у птиц.

Способ применения: препарат применяется с 21-х суток в течение 5-ти суток. Содержимое одного пакета (3 г) растворить в 3 литрах питьевой воды. Раствор использовать в день приготовления. 1 пакет на 50 птенцов на 1 день.

5. ЦИАНОФОР (пероральный раствор) - комбинированный препарат, содержит бутафосфан – 100 мг/мл, цианокобаламин (витамин В12) - 0,05 мг/мл.

Бутафосфан пополняет организм фосфором, стимулирует процессы обмена, нормализует уровень гормона стресса - кортизола, ускоряет утилизацию глюкозы в крови и активизирует энергетический обмен, улучшает функцию печени, повышает неспецифическую резистентность организма, активизирует двигательную активность сердечной и скелетных мышц, способствует образованию костной ткани.

Витамин В12 стимулирует кроветворение, активизирует синтез креатина, жировой обмен, биосинтез метионина, нормализует процесс усвоения пищи.

Способ применения: препарат применяется с 1-х суток в течение 3-х суток вместе с антибиотиком. Содержимое одной ампулы (1 мл) растворить в 1 литре питьевой воды. Раствор использовать в день приготовления. Содержимое 1 ампулы рассчитано на 50 птенцов на 1 день. (см. п. 1).

В состав аптечки входят:

1. Паратил (пероральный раствор) - 3 ампулы по 1 мл.

2. Аскорбиновая кислота (Витамин С) (порошок) -1 пакет -2 г. (Важно учитывать правильность применения. См. п. 2)

Напишите нам, мы онлайн!

3. ДЕКАВИТ (пероральный раствор) 5 ампул по 1 мл.
4. Тримератинвет (порошок) - 5 пакетов по 3 г.
5. ЦИАНОФОР (пероральный раствор) 3 ампулы по 1 мл.
6. Рекомендация по применению.

Рекомендуемая схема последовательности применения препаратов:

Возраст птенцов в днях	Паратил пероральный раствор	Аскорбиновая кислота порошок (на кончике ножа)	ДЕКАВИТ пероральный раствор	Тримератинвет порошок	ЦИАНОФОР пероральный раствор
с 1 по 3	+	+	-	-	+
с 4 по 8	-	-	+	-	-
с 9 по 20	-	+	-	-	-
с 21 по 25	-	+	-	+	-

Срок годности Аптечки: Внимание! В состав ветеринарной Аптечки входят препараты с различным сроком годности. Поэтому срок годности Аптечки ветеринарной указан по препарату, срок годности которого заканчивается раньше всех.

**НЕТ ОТЗЫВОВ О ДАННОМ ТОВАРЕ.**

**НАПИСАТЬ ОТЗЫВ**

Напишите нам, мы онлайн!