

**Кламоксил LA**  
**( суспензія для ін'єкцій)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Суспензія білого кольору.

**Склад**

1мл препарату містить діючу речовину:

амоксицилін тригідрат -150,0 мг.

Допоміжні речовини: алюміній стеарат, олія кокосова фракціонована.

**Фармакологічні властивості**

Амоксицилін є антибіотиком широкого спектру дії, що належить до бета-лактамної групи. Це напівсинтетичний пеніцилін, чутливий до дії пеніцилінази.

Амоксицилін порушує синтез бактеріальної клітинної стінки шляхом інгібування ензимів транспептидази та карбоксипептидази, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель бактерії у фазі росту. Амоксицилін виявляє активність проти грампозитивних та грамнегативних бактерій: *Actinobacillus lignieresii*, *Actinobacillus equuli*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli* (окрім штамів виробляючих бета-лактамазу), *Corynebacterium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis* (окрім штамів виробляючих бета-лактамазу), *Salmonella spp.*, *Actinomyces bovis*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.* (окрім штамів виробляючих бета-лактамазу).

**Застосування**

Лікування великої рогатої худоби, овець, свиней, собак та котів при захворюваннях травного каналу (ентерити), органів дихання (пневмонії, бронхопневмонії) та сечостатевої системи (цистити, метрити), суглобів, шкіри та м'яких тканин, а також для попередження післяопераційних інфекцій, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

**Дозування**

Внутрішньом'язово (свині), підшкірно (велика рогата худоба, вівці, кози, собаки, коти).

Рекомендована доза 15 мг діючої речовини на кг маси тіла тварини, або 1,0 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини один раз на добу. Доза може бути повторено введена після 48 годин.

У таблиці приведено дозування для різних видів тварин.

Вид тварини	Маса тіла тварини (кг)	Доза препарату(мл)
Велика рогата худоба	450	45,0
Бички-відгодівлі	200	20,0
Телята	50	5,0
Вівці	65	6,5
Ягнята	10	1,0
Свиноматки	150	15,0
Поросята-відгодівлі	70	7,0
Підсвинки	7	0,7
Собаки великих порід	35	3,5
Собаки середніх порід	20	2,0
Собаки малих порід	10	1,0
Коти	5	0,5

Перед застосуванням флакон з препаратом ретельно струшують. Ввести препарат внутрішньом'язово або підшкірно, після введення зробити масаж на місці ін'єкції. Якщо об'єм ін'єкції перевищує 20 мл - для великої рогатої худоби, то доза має бути розділена на дві частини та введена у два різні місця тіла. Суспензія не вводиться внутрішньовенно.

### **Протипоказання**

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до амоксициліну, а також кролям, хом'якам, мурчакам та іншим дрібним травоядним тваринам.

Не вводити внутрішньовенно. Не застосовувати лактуючим вівцям, молоко яких споживається в їжу людям.

### **Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 49 (велика рогата худоба, вівці, кози) та 33 (свині) діб після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяють через 9 діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Пеніциліни та цефалоспорины можуть спричинити гіперчутливість (алергію) після контакту з препаратами. Гіперчутливість до пеніцилінів може призводити до виникнення перехресних реакцій з цефалоспоринами та навпаки. Алергічні реакції на ці речовини можуть бути серйозними. Застосовуйте препарат з обережністю. Якщо відбувся контакт з препаратом і у вас з'явилися симптоми алергії (почервоніння шкіри), зверніться за консультацією до лікаря. Свербіж обличчя, очей чи губ, важке дихання є більш серйозними симптомами і потребують негайної медичної допомоги. Після роботи з препаратом необхідно вимити руки.

### **Форма випуску**

Прозорі скляні флакони типу III з гумовою пробкою під алюмінієвою обкаткою по 100 мл. Вторинне пакування – коробки, що містять 6 флаконів по 100 мл.

### **Зберігання**

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15° до 25°С.

Термін придатності – 3 роки.

Після відбору першої дози препарат необхідно використати протягом 28 діб при умові зберігання в сухому темному місці при температурі від 15° до 25°С.

### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення:**

Зоетіс Інк.,  
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью Джерсі  
07932, Сполучені Штати Америки

Zoetis Inc.,  
100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey  
07932, USA

#### **Виробник готового продукту:**

Хаупт Фарма Латина ес. ар. ел.  
сс. 156 км 47, 600  
04100 Борго Сан Мішель (еЛ. Ті.)  
Італія

Haupt Pharma Latina s.r.l.  
SS 156 km 47,600  
04100 Borgo San Michele (LT)  
Italy