

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Дурамун Плюс 5Л4 – вакцина комбінована проти чуми м'ясоїдних, аденовірозу, парагрипу, парвовірозу та лептоспірозу собак.

Склад

Вакцина складається з двох компонентів: Дурамун Плюс 5Л4 – ліофілізований компонент та Стерильна суспензія – рідкий компонент.

Дурамун Плюс 5Л4 містить наступні компоненти:

Живі атенуйовані віруси:

вірус чуми м'ясоїдних (CDV), штам Snyder Hill	$\geq 10^{2,5}$ TCID ₅₀ /дозу,	0,0286 мл
аденовірус собак типу 2 (CAV-2), штам Manhattan	$\geq 10^{2,9}$ TCID ₅₀ /дозу,	0,0018 мл
вірус парагрипу собак (CPiV), штам NL-CPI-5	$\geq 10^{5,0}$ TCID ₅₀ /дозу,	0,0453 мл
парвовірус (CPV), штам NL-35-D	$\geq 10^{7,0}$ CCID ₅₀ /дозу,	0,0720 мл
Бактерин (інактивовані культури):		
Leptospira canicola, штам C-51	≥ 600 ООЩ/дозу*,	0,0105 мл
Leptospira grippotyphosa, штам MAL 1540	≥ 600 ООЩ/дозу,	0,0076 мл
Leptospira icterohaemorrhagiae, штам NADL (11403),	≥ 600 ООЩ/дозу,	0,0057 мл
Leptospira pomona, штам T262	≥ 600 ООЩ/дозу,	0,0076 мл

*ООЩ – одиниця оптичної щільності, що визначається нефелометричним методом.

Допоміжні речовини: гентаміцин, NZ амін AS стабілізуючий розчин, желатиновий стабілізуючий розчин, тіомерсал, сахарозний стабілізуючий розчин, середовище Хенкса, 10% противоспінювачу.

Стерильна суспензія містить наступні компоненти:

Гідрохлорид алюмінію та стерильна вода.

Фармацевтична форма

Ліофілізат і суспензія.

Імунобіологічні властивості

Через 14 днів після застосування вакцини за рекомендованою схемою утворюється активний імунітет, який триває до 1-го року проти чуми м'ясоїдних (CDV), викликаного вірусом чуми м'ясоїдних, інфекційного гепатиту, викликаного аденовірусом типу 1 (CAV-1), респіраторних захворювань, викликаних аденовірусом типу 2 (CAV-2), парагрипу (CPiV), викликаного вірусом парагрипу собак, парвовірусом (CPV) та лептоспірозу, викликаного *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira pomona*.

Вид тварин

Собаки.

Показання до застосування


Для активної імунізації клінічно здорових собак від 6 тижнів і старших проти чуми м'ясоїдних, інфекційного гепатиту, респіраторних захворювань, викликаних аденовірусом типу 2 (CAV-2), парагрипу, інфекційного ентериту, парвовірусом (CPV) та лептоспірозу, викликаного *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira pomona*.

Протипоказання

Цей препарат може бути застосований тільки для імунізації здорових тварин. Захисна імунна відповідь не може бути отримана у тварин які:

- мають інкубаційний період інфекційного захворювання;
- знаходяться в стані виснаження;
- уражені гельмінтами;
- перебувають у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані.

Напружений імунітет може бути не вироблений також у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки вкладки.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00736-02-14
від 05.10.2015

Застереження при застосуванні

Застосовуючи вакцину потрібно використовувати стерильні одноразові шприці та голки. В зв'язку з дозуванням та методом введення, передозування неможливе.

Взаємодія з іншими засобами

Не відомо.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Слід уникати вакцинації вагітних самок.

Спосіб застосування та дози

Загальні вказівки: асептично розчинити ліофілізований компонент вакцини (Дурамун Плюс 5Л4) за допомогою рідкої фракції, що додається (Стерильна суспензія), добре збовтати, та ввести 1 мл підшкірно або внутрішньом'язово.

Первинна вакцинація: клінічно здоровим собакам ввести 2 дози, кожна з інтервалом 3 тижні. Для того, щоб запобігти взаємодії з материнськими антитілами, цуценята віком до 9 тижнів повинні отримати 3 дози комбінованої вакцини з інтервалом 3 тижні.

Ревакцинація: рекомендується щорічна ревакцинація однією дозою.

Побічні ефекти

Іноді введення вакцини може викликати реакцію у вигляді анафілаксії. У цьому випадку тварині негайно вводять адреналін або його аналоги і надалі проводять симптоматичну терапію.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

У разі випадкового введення людині необхідно негайно звернутись до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

Термін придатності

18 місяців. Вміст флакону необхідно використати одразу після відкриття.

Умови зберігання і транспортування

Суше темне, недоступне для дітей місце за температури від 2 °С до 7 °С. Тривалий вплив високої температури та/або прямих сонячних променів може негативно вплинути на дію препарату.

Не заморозувати!

Упаковка

Щільно укуповрені однодозові скляні флакони, що вміщують ліофілізовану фракцію (Дурамун Плюс 5Л4) та однодозові пластикові флакони, що вміщують рідку фракцію (Стерильна суспензія).

В одній пластиковій упаковці міститься 25 доз вакцини та 25 флакончиків з рідким розчинником (разом 50 флаконів).

Правила відпуску

За рецептом.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 100 Флорхем Парк, Нью Джерсі, 07932, США.

Назва та місцезнаходження діяльності виробника

Зоетіс Інк., 601 Вест Хорнхаскер Хайвей, Лінкольн, Небраска, 68521, США.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.